



# **VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles en Haïti**

**Résultats de l'Enquête Mortalité,  
Morbidity et Utilisation des Services  
Haïti 2000**

Ministère de la Santé Publique et de la Population

# **VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles en Haïti**

**Résultats de l'Enquête Mortalité,  
Morbidity et Utilisation des Services  
Haïti 2000**

Institut Haïtien de l'Enfance  
Pétionville, Haïti

ORC Macro  
Calverton, Maryland, USA

Juin 2002

Citation recommandée pour ce document :

Cayemittes, Michel, Florence Placide, Bernard Barrère, Soumaila Mariko, Blaise Sévère. 2002. *VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles en Haïti : Résultats de l'Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-III), Haïti 2000*. Calverton, Maryland, USA : ORC Macro.

Des informations complémentaires sur l'EMMUS-III peuvent être obtenues auprès de l'Institut Haïtien de l'Enfance, 41 Rue Borno, Pétionville, Haïti, P.O. Box 15606. Téléphone : (509) 257 31 01, 257 15 08 ; e-mail : [ihe@dnetwork.net](mailto:ihe@dnetwork.net). Des renseignements concernant le programme MEASURE DHS+, des copies de ce rapport ainsi que des copies du rapport final de l'enquête peuvent être obtenus auprès de ORC Macro, 11785 Beltsville Drive, Calverton, MD 20705, USA (Téléphone 301-572-0200 ; Téléc 198116 ; Fax 301-572-0999; E-mail : [reports@macroint.com](mailto:reports@macroint.com); Internet : [www.measuredhs.com](http://www.measuredhs.com)).

## Introduction

Ce rapport sur le VIH/Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles en Haïti a été préparé pour la XIV<sup>e</sup> *Conférence Internationale sur le Sida* de Barcelone, Espagne, Juillet 2002. Le texte est une réimpression du rapport final de l'Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-III)<sup>1</sup>.

La troisième Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-III), commanditée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), a été réalisée de février à juillet 2000 par l'Institut Haïtien de l'Enfance (IHE) avec l'assistance technique du programme international des Enquêtes Démographiques et de Santé (DHS) de ORC Macro.

L'EMMUS-III avait pour objectif d'estimer de nombreux indicateurs socio-économiques, démographiques et sanitaires au niveau de l'ensemble de la population et au niveau des sous-populations des femmes de 15-49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15-59 ans. Afin d'atteindre ces objectifs quatre types de questionnaires ont été utilisés : un questionnaire ménage portant sur tous les membres des ménages et sur certaines caractéristiques des logements ; un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans et leurs enfants ; un questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans et un questionnaire communautaire portant sur les infrastructures socio-économiques et sanitaires de chacune des grappes de l'échantillon.

L'EMMUS-III a porté sur un échantillon représentatif au niveau national. Les résultats sont disponibles pour le milieu urbain, le milieu rural, la zone métropolitaine de Port-au-Prince et les neuf départements. Au total, 9 595 ménages, 10 159 femmes et 3 171 hommes ont été enquêtés avec succès. Les données sur le VIH/sida et les IST ont été collectées auprès de la moitié de l'échantillon des femmes (soit, au total, 5 161) et sur l'ensemble de l'échantillon des hommes (3 171).

---

<sup>1</sup> Cayemittes, Michel, Florence Placide, Bernard Barrère, Soumaila Mariko, Blaise Sévère. 2001. *Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti 2000*. Calverton, Maryland, USA : Institut Haïtien de l'Enfance et ORC Macro.





Depuis quelque temps déjà, le Syndrome de l'Immuno Déficience Acquis (Sida) est considéré en Haïti comme un problème majeur de santé publique et constitue pour les responsables du Ministère de la Santé Publique et de la population un sujet de très grande préoccupation. En effet, toutes les enquêtes conduites en Haïti au cours de la dernière décennie confirment le caractère généralisé de l'épidémie, et Haïti est le pays de la zone Amérique le plus touché par cette pandémie. Le mode de transmission du Virus de l'Immuno déficience Humaine (VIH) est essentiellement hétérosexuel. Parallèlement les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) accusent une prévalence élevée.

L'ampleur du problème du Sida et des IST est conditionnée par beaucoup de facteurs dont l'existence de certains tabous et croyances fortement ancrés dans la culture haïtienne, le faible niveau d'instruction de la population, la dégradation de la situation socio-économique accentuant la pauvreté, certains mouvements migratoires entraînant une "bidonvillisation" croissante des principales villes du pays et la faible prise en charge des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et des personnes vivant avec le VIH. Finalement il faut souligner un manque d'engagement de la société tout entière dans la lutte contre ces maladies, accompagné de la précarité des ressources.

Plusieurs sujets ont été étudiés au cours de l'enquête, afin de pouvoir apprécier les connaissances, attitudes et comportements de la population vis-à-vis du VIH/Sida et des IST à savoir :

- la connaissance de l'existence du VIH/Sida, des moyens de prévention et de ses modes de transmission ;
- la perception du VIH/Sida et du risque de le contracter ;
- les comportements adoptés pour ne pas contracter le VIH/Sida ;
- l'aspect social de la prévention du VIH/Sida ;
- la connaissance des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ;
- la prévalence des IST et le comportement adopté ;
- le nombre de partenaires sexuels ;
- la connaissance et l'utilisation du condom.

Il faut préciser que les questions sur le VIH/Sida et les IST n'ont été posées qu'aux femmes et aux hommes éligibles dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux.

## **1.1 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA**

Le niveau de connaissance qu'une population a d'une maladie conditionne bien souvent son attitude et son comportement vis-à-vis de cette maladie. Au cours de l'EMMUS-III, il était donc important de déterminer le niveau de connaissance du VIH/Sida par la population enquêtée.

L'existence du VIH/Sida est connue par pratiquement toute la population (plus de 97 %) quel que soient le sexe des enquêtés, l'âge, l'état matrimonial, le milieu de résidence, le département et le niveau d'instruction (tableau 1.1). Les niveaux de connaissance varient de 94 % à plus de 99 % chez les femmes et de 95 % à 100 % chez les hommes.

**Tableau 1.1 Connaissance du VIH/Sida**

Pourcentage des femmes et d'hommes qui ont entendu parler du VIH/Sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage qui ont entendu parler du VIH/Sida	Effectif	Pourcentage qui ont entendu parler du VIH/Sida	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>				
15-19	96,7	1 211	94,7	768
20-24	97,6	961	99,6	512
25-29	97,8	770	99,1	448
30-39	97,0	1 278	99,1	589
40-49	97,6	942	99,6	282
50-59	-	-	97,2	571
<b>État matrimonial</b>				
Jamais en union	97,1	1 615	96,5	1 441
Union avec cohabitation	97,2	2 537	98,8	1 430
Union sans cohabitation	97,9	466	100,0	118
Union rompue	97,5	544	99,1	182
<b>Milieu de résidence</b>				
Aire Métropolitaine	98,8	1 770	99,5	811
Autre urbain	97,8	594	99,0	356
Ensemble urbain	98,5	2 364	99,3	1 166
Rural	96,2	2 798	96,9	2 005
<b>Département</b>				
Aire Métropolitaine	98,8	1 770	99,5	811
Nord	96,7	438	98,5	280
Nord-Est	99,1	173	97,6	100
Nord-Ouest	95,4	183	94,6	136
Artibonite	93,0	813	95,8	525
Centre	96,4	350	95,0	245
Ouest	98,7	613	99,9	466
Sud	97,2	327	97,8	241
Sud-Est	97,2	238	97,0	160
Grande-Anse	99,4	256	97,4	207
<b>Niveau d'instruction</b>				
Aucun	93,7	1 273	95,0	531
Alphabét./Primaire	98,4	2 444	97,5	1 536
Secondaire ou +	98,5	1 445	99,7	1 104
<b>Ensemble</b>	97,3	5 161	97,8	3 171

Bien que la grande majorité des femmes aient entendu parler du VIH/Sida, seulement 62 % connaissent, au moins, un moyen pour éviter de le contracter, 14 % des femmes ne connaissent pas l'existence du VIH/Sida ou ne savent pas s'il peut être évité et 24 % pensent qu'il ne peut être évité (tableau 1.2.1). Les deux moyens d'éviter la transmission du VIH les plus connus sont l'utilisation du condom et l'unipartenariat cités respectivement par 39 % et 32 % des enquêtées.

Tableau 1.2.1 Connaissance par les femmes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida

Pourcentage de femmes qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Moyens d'éviter le VIH/Sida										Ne connaît pas VIH/Sida ou ne sait que le VIH/Sida ne peut pas si le VIH/ ne peut pas être évité		Effectif de femmes
	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un partenaire unique	Éviter les partenaires multiples	Demander au partenaire d'être fidèle	Éviter les prostituées	Éviter qui a plusieurs partenaires	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Éviter de partager les lames/ rasoirs	Éviter d'em-brasser	Autres moyens être évité	
<b>Groupe d'âges</b>													
15-19	11,9	38,6	17,0	5,3	5,3	0,6	1,4	1,8	3,0	5,8	0,8	1,3	1 211
20-24	12,8	49,7	33,3	7,2	7,8	1,5	2,9	4,3	5,6	7,7	0,6	1,0	961
25-29	11,7	42,7	35,0	8,2	11,2	1,5	2,3	6,1	5,3	7,2	2,7	1,0	770
30-39	9,4	37,1	37,7	8,3	11,8	0,8	1,2	3,4	4,0	7,2	0,7	0,7	1 278
40-49	10,5	29,5	38,9	7,4	9,8	0,9	2,0	4,0	4,3	4,7	0,8	0,9	942
<b>État matrimonial</b>													
Jamais en union	17,4	45,5	26,9	6,5	4,8	1,1	1,8	4,1	5,2	9,0	1,6	1,7	1 615
Union avec cohabitation	6,4	33,0	36,8	7,9	11,2	1,0	1,8	2,6	3,1	4,3	0,8	0,6	2 537
Union sans cohabitation	6,4	41,5	26,3	7,1	11,3	0,9	4,0	5,8	4,4	7,8	0,7	1,1	466
Union rompue	19,0	47,6	28,0	6,8	10,3	0,8	0,6	5,7	7,7	8,3	0,6	0,5	544
<b>Milieu de résidence</b>													
Aire Métropolitaine	16,4	61,8	43,0	10,6	12,6	1,2	1,7	5,6	6,1	10,8	1,3	0,9	1 770
Autre urbain	12,3	43,6	27,5	7,1	4,4	1,2	2,4	4,2	4,6	6,7	0,6	1,2	594
Ensemble urbain	15,4	57,2	39,1	9,7	10,5	1,2	1,8	5,2	5,7	9,8	1,1	0,9	2 364
Rural	7,6	24,0	25,7	5,2	7,8	0,8	1,9	2,4	3,2	3,8	0,9	1,0	2 798
<b>Département</b>													
Aire Métropolitaine	16,4	61,8	43,0	10,6	12,6	1,2	1,7	5,6	6,1	10,8	1,3	0,9	1 770
Nord	4,7	25,5	22,7	8,8	6,4	0,2	0,3	1,5	2,1	3,4	0,3	0,8	438
Nord-Est	16,7	32,2	38,5	7,2	4,1	2,0	2,7	5,7	4,7	3,6	1,1	1,0	173
Nord-Ouest	7,6	27,9	21,3	3,5	3,8	1,1	1,0	3,5	4,5	3,2	0,5	0,2	183
Artibonite	3,9	20,7	15,9	2,2	4,5	1,2	0,9	1,5	2,9	2,5	0,7	0,3	813
Centre	11,6	24,9	17,9	2,3	3,0	0,7	3,6	0,6	3,4	2,5	0,2	0,1	350
Ouest	12,1	31,5	36,7	8,2	17,5	0,9	3,6	5,1	5,7	7,2	1,8	2,6	613
Sud	8,4	26,2	28,7	6,2	4,4	0,4	2,1	2,3	1,6	4,6	0,9	0,4	327
Sud-Est	4,6	28,6	31,9	2,5	2,7	0,2	2,7	2,6	1,9	5,8	0,0	0,3	238
Grande-Anse	14,3	43,2	35,3	10,2	10,8	2,0	1,7	4,4	4,2	6,3	2,1	3,9	256
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucun	4,7	15,7	28,5	5,1	8,3	0,8	0,9	0,6	1,6	2,4	0,5	0,3	1 273
Alphabét./Primaire	9,3	37,0	28,0	6,2	9,8	0,8	1,9	2,6	2,5	4,3	0,8	0,8	2 444
Secondaire ou plus	20,1	63,8	41,2	10,9	8,6	1,5	2,7	8,3	9,9	13,8	1,8	1,8	1 445
Ensemble des femmes	11,2	39,2	31,8	7,2	9,1	1,0	1,9	3,7	4,3	6,5	1,0	1,0	5 161



La proportion de femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida, ne savent pas s'il peut être évité ou pensent qu'il ne peut être évité (38 % dans l'ensemble) atteint 51 % chez les femmes vivant en milieu rural, 60 % chez celles n'ayant aucune instruction et 62 % dans l'Artibonite.

Des différences apparaissent dans les taux de réponses quant aux moyens d'éviter le VIH/Sida par rapport à la moyenne nationale. L'utilisation du condom est relativement plus citée par les jeunes adultes (20-24 ans), les personnes en union rompue, celles vivant dans l'Aire Métropolitaine, dans le département de la Grande Anse et celles de niveau d'instruction secondaire ou plus. En ce qui concerne l'unipartenariat, le pourcentage d'enquêtées l'ayant cité augmente avec l'âge et est plus élevé chez les femmes en union avec cohabitation, celles du milieu urbain, des départements du Nord-Est et de l'Ouest et chez les femmes ayant atteint le niveau d'instruction secondaire ou plus.

Le tableau 1.2.2 montre que pour les hommes interviewés, 81 % connaissent, au moins, un moyen pour éviter de contracter le VIH/Sida : 6 % des hommes ne connaissent pas l'existence du VIH/Sida ou ne savent pas s'il peut être évité et 14 % pensent qu'il ne peut être évité. Les deux moyens de transmission du VIH les plus connus sont identiques à ceux qui avaient été rapportés par les femmes : l'utilisation du condom (55 %) et l'unipartenariat (37 %).

La proportion d'hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida, ne savent pas s'il peut être évité ou pensent qu'il ne peut être évité (19 % dans l'ensemble) est particulièrement élevée parmi les hommes de 40 ans et plus (plus de 27 %), ceux vivant en milieu rural (26 %), dans le département du Centre (27 %) et chez les hommes sans instruction (35 %).

L'utilisation du condom était d'autant plus citée que l'enquêté était jeune, qu'il vivait en union sans cohabitation, qu'il était urbanisé et qu'il était éduqué. Les hommes de la Grande-Anse (65 %) ont également cité l'utilisation du condom plus fréquemment que ceux des autres départements. Par rapport à la moyenne nationale, l'unipartenariat a été donné comme réponse plus souvent par les hommes les plus âgés, ceux en union avec cohabitation, et ceux vivant dans l'Aire Métropolitaine et dans la Grande-Anse. "Eviter des prostituées" a été cité par 8 % des hommes interviewés et par 20 % de ceux vivant en union sans cohabitation.

La connaissance de trois moyens spécifiques d'éviter la transmission du VIH, à savoir l'utilisation du condom, l'abstinence sexuelle et l'unipartenariat, est considérée comme essentielle d'un point de vue programmatique. Aussi, après avoir demandé aux enquêtés de citer les moyens d'éviter la transmission du VIH qu'ils connaissaient, on leur a demandé spécifiquement s'ils pensaient qu'il était possible d'éviter le Sida en s'abstenant de rapports sexuels, en utilisant des condom au cours de chaque rapport sexuel et en n'ayant qu'un seul partenaire qui n'a aucun autre partenaire.

Tableau 1.2.2. Connaissance par les hommes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida

Pourcentage d'hommes qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Moyens d'éviter le VIH/Sida										Ne connaît pas VIH/Sida ou quelle le VIH/ ne peut être évité		Effectif d'hommes	
	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un seul partenaire	Éviter les multiples partenaires	Demander au partenaire d'être fidèle	Éviter les prostituées	Éviter qui a plusieurs partenaires	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Éviter de partager les lames/rasoirs	Éviter d'em-brasser	Autres moyens		
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	17,9	61,4	19,8	4,5	0,1	8,1	3,8	6,2	6,1	12,5	0,6	3,4	6,8	727
20-24	21,0	71,6	28,0	5,4	3,3	11,3	5,8	8,6	4,3	11,5	5,1	2,0	4,7	510
25-29	24,4	63,6	37,9	9,0	1,6	5,6	8,0	7,2	3,7	8,7	6,0	5,8	6,3	444
30-39	14,0	59,8	47,3	7,2	1,6	7,5	5,0	3,3	4,0	10,3	2,2	0,8	3,6	584
40-49	10,9	31,3	44,9	10,7	4,7	8,7	7,1	2,9	2,9	6,8	0,5	1,9	7,5	281
50-59	14,4	32,7	50,5	5,2	6,4	6,8	5,3	1,6	5,7	7,6	0,8	1,3	5,8	555
<b>État matrimonial</b>														
Jamais en union	21,8	63,9	24,9	5,7	1,4	8,2	5,7	8,2	5,7	13,4	1,2	2,9	6,3	1 390
Union avec cohabitation	11,7	43,3	52,2	7,6	4,3	6,4	5,5	2,3	4,2	7,4	2,8	2,3	5,5	1 413
Union sans cohabitation	17,8	82,5	21,3	2,9	1,0	20,4	2,6	2,4	4,4	6,9	14,8	0,2	0,0	118
Union rompue	27,9	63,8	16,0	5,8	1,4	10,9	6,0	3,9	1,5	6,3	1,3	2,0	5,9	181
<b>Milieu de résidence</b>														
Aire Métropolitaine	21,6	73,9	44,0	8,3	5,4	6,1	4,9	11,8	10,5	17,2	2,4	2,8	3,1	806
Autre urbain	23,1	70,2	31,4	4,7	1,9	7,0	6,7	5,4	6,6	13,1	1,5	1,7	3,7	352
Ensemble urbain	22,1	72,8	40,2	7,2	4,3	6,4	5,5	9,9	9,3	15,9	2,1	2,5	3,3	1 159
Rural	14,5	44,7	34,6	6,1	1,7	9,0	5,6	2,2	2,0	6,4	2,6	2,5	7,1	1 943
<b>Département</b>														
Aire Métropolitaine	21,6	73,9	44,0	8,3	5,4	6,1	4,9	11,8	10,5	17,2	2,4	2,8	3,1	806
Nord	10,2	39,8	27,9	4,8	1,2	7,1	4,6	2,5	3,2	7,0	0,3	1,0	9,0	276
Nord-Est	14,3	46,3	28,8	6,9	1,4	12,0	4,7	2,9	5,1	11,8	0,6	5,5	6,0	97
Nord-Ouest	21,0	43,0	26,1	3,6	3,3	10,3	5,4	1,5	4,9	6,4	0,3	3,4	6,5	129
Artibonite	11,8	50,4	37,4	6,8	0,1	10,3	6,3	0,1	0,0	3,7	6,9	4,8	3,8	502
Centre	18,6	37,4	38,7	6,5	0,3	7,8	0,5	1,2	1,6	5,8	5,3	1,1	11,8	232
Ouest	14,2	55,3	30,7	5,3	5,4	6,7	4,6	6,2	4,9	9,0	0,5	2,1	9,0	465
Sud	7,1	42,8	28,4	2,3	1,3	6,4	7,3	2,1	2,1	6,2	0,2	0,0	6,2	236
Sud-Est	16,2	49,2	41,1	5,1	0,5	9,9	19,6	5,2	3,6	12,0	0,8	0,4	3,6	155
Grande-Anse	41,7	65,2	45,7	11,2	0,3	11,2	2,6	2,7	2,3	12,3	1,8	2,7	1,6	202
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	15,2	31,4	40,5	7,6	2,9	7,1	8,7	0,8	0,6	2,2	0,9	1,1	9,8	505
Alphabét./Primaire	13,8	49,3	30,9	7,2	1,7	8,3	4,9	3,2	2,0	7,9	3,7	2,5	7,2	1 497
Secondaire ou plus	23,3	74,3	42,8	5,0	3,9	8,0	4,9	9,6	10,3	16,3	1,5	3,1	1,7	1 101
Ensemble des hommes	17,4	55,2	36,7	6,5	2,7	8,0	5,5	5,1	4,7	10,0	2,5	2,5	5,7	3 102

Un peu plus d'une femme sur trois (35 %) connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun des moyens importants de l'éviter (tableau 1.3.1). Ces femmes sous-informées se retrouvent surtout chez les 15-19 ans, celles vivant en union, celles du milieu rural, des départements de l'Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest et du Nord. De même, 53 % des femmes sans instruction ne connaissent aucun de ces moyens. Les femmes les mieux informées (celles qui connaissent deux moyens ou plus) sont celles de 20-29 ans (63 %), les célibataires (62 %), les femmes en union rompue (63 %), celles du milieu urbain (74 %) et en particulier celles de la capitale (78 %), les femmes de l'Ouest et de la Grande-Anse (67 %) et celles de niveau secondaire (81 %). Un peu plus de la moitié des femmes (58 %) ont pu identifier, au moins, deux moyens importants de protection, en particulier l'unipartenariat (59 %) et l'utilisation du condom (50 %).

**Tableau 1.3.1 Connaissance par les femmes de moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida**

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes selon leur connaissance de moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Ne connaît pas le VIH/Sida	Connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun moyen important	Nombre de moyens importants connus			Pourcentage connaissant certains moyens spécifiques <sup>2</sup>		Effectif de femmes
			Un	Deux ou plus	Total <sup>1</sup>	Utilisation du condom	Avoir un seul partenaire	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	2,7	42,6	3,7	50,4	100,0	46,6	50,0	1 211
20-24	1,7	28,9	6,1	62,6	100,0	58,0	64,5	961
25-29	1,6	31,4	2,3	64,1	100,0	54,7	65,4	770
30-39	2,4	34,5	3,7	58,9	100,0	50,1	61,6	1 278
40-49	1,3	36,8	5,2	55,6	100,0	43,8	58,3	942
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union	2,5	31,8	3,4	62,0	100,0	54,7	61,7	1 615
Union avec cohabitation	1,9	38,4	4,7	54,2	100,0	45,1	57,8	2 537
Union sans cohabitation	1,6	37,4	4,3	56,2	100,0	52,3	57,8	466
Union rompue	1,1	29,3	4,7	63,4	100,0	59,5	61,3	544
<b>Milieu de résidence</b>								
Aire Métropolitaine	0,8	17,0	4,1	77,7	100,0	71,1	78,3	1 770
Autre urbain	1,0	33,2	2,3	62,3	100,0	56,6	63,4	594
Ensemble urbain	0,8	21,1	3,7	73,8	100,0	67,5	74,6	2 364
Rural	3,0	47,3	4,7	44,2	100,0	35,8	46,6	2 798
<b>Département</b>								
Aire Métropolitaine	0,8	17,0	4,1	77,7	100,0	71,1	78,3	1 770
Nord	2,0	51,5	2,8	42,3	100,0	35,7	44,2	438
Nord-Est	0,8	37,3	4,1	57,7	100,0	46,6	59,2	173
Nord-Ouest	4,0	52,7	0,4	42,3	100,0	36,0	41,8	183
Artibonite	5,1	55,2	5,2	32,6	100,0	25,9	34,7	813
Centre	3,0	52,8	3,1	40,6	100,0	32,8	40,7	350
Ouest	1,1	28,2	4,0	66,5	100,0	52,3	68,8	613
Sud	2,0	45,1	4,1	47,9	100,0	42,5	50,1	327
Sud-Est	2,5	43,6	11,3	42,3	100,0	38,4	51,1	238
Grande-Anse	0,6	29,6	2,9	66,8	100,0	61,3	68,4	256
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	5,0	52,9	4,6	36,2	100,0	27,1	40,1	1 273
Alphabét./Primaire	1,1	39,6	3,4	55,4	100,0	47,9	56,6	2 444
Secondaire ou plus	0,9	12,5	5,3	80,7	100,0	74,8	81,0	1 445
Ensemble des femmes	2,0	35,3	4,2	57,8	100,0	50,3	59,4	5 161

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

<sup>2</sup> Ont déclaré connaître ce moyen après qu'une question spécifique ait été posée sur ce moyen.

Un peu moins d'un homme sur cinq (19 %) connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun des moyens importants de l'éviter (tableau 1.3.2). Ces hommes sous-informés sont en priorité les jeunes de 15-19 ans et ceux de 40 ans et plus, ceux vivant en union avec cohabitation ou en union rompue, ceux du milieu rural, des départements du Nord-Ouest, du Nord, du Nord-Est et du Sud. De plus, 33 % des hommes sans instruction ne connaissent aucun de ces moyens. Les hommes les mieux informés (ceux qui connaissent deux moyens ou plus) sont ceux de 20-39 ans (83 % et plus), les hommes en union sans cohabitation (90 %), ceux du milieu urbain (90 %) et en particulier ceux de l'Aire Métropolitaine (94 %), les hommes du Sud-Est (85 %) et de la Grande-Anse (84 %) et ceux de niveau secondaire (93 %). Un peu plus des trois quarts des hommes (77 %) ont pu identifier, au moins, deux moyens importants de protection, en particulier l'unipartenariat (77 %) et l'utilisation du condom (71 %).

**Tableau 1.3.2 Connaissance par les hommes de moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida**

Répartition (en %) de l'ensemble des hommes selon leur connaissance de moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Ne connaît pas le VIH/Sida	Connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun moyen important	Nombre de moyens importants connus		Total <sup>1</sup>	Pourcentage connaissant certains moyens spécifiques <sup>2</sup>		
			Un	Deux ou plus		Utilisation du condom	Avoir un seul partenaire	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	5,3	20,3	2,0	72,4	100,0	68,4	70,7	768
20-24	0,4	11,2	1,5	87,0	100,0	82,4	84,9	512
25-29	0,9	14,9	1,0	83,2	100,0	79,9	83,1	448
30-39	0,9	14,2	1,9	83,0	100,0	75,9	83,0	589
40-49	0,4	26,9	1,3	71,3	100,0	62,5	71,8	282
50-59	2,8	27,0	3,5	66,6	100,0	53,5	69,0	571
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union	3,5	17,0	1,5	78,0	100,0	73,4	76,1	1 441
Union avec cohabitation	1,2	21,1	2,5	75,2	100,0	65,4	76,6	1 430
Union sans cohabitation	0,0	6,4	3,6	90,0	100,0	90,6	87,5	118
Union rompue	0,9	21,2	0,5	77,4	100,0	74,1	76,5	182
<b>Milieu de résidence</b>								
Aire Métropolitaine	0,5	4,9	1,0	93,5	100,0	84,4	91,7	811
Autre urbain	1,0	12,0	4,9	82,1	100,0	80,4	80,8	356
Ensemble urbain	0,7	7,1	2,2	90,0	100,0	83,2	88,4	1 166
Rural	3,1	25,5	1,8	69,6	100,0	63,1	70,0	2 005
<b>Département</b>								
Aire Métropolitaine	0,5	4,9	1,0	93,5	100,0	84,4	91,7	811
Nord	1,5	30,8	3,3	64,3	100,0	56,2	63,4	280
Nord-Est	2,4	28,9	3,1	65,6	100,0	62,1	64,7	100
Nord-Ouest	5,4	37,7	0,9	56,0	100,0	49,7	55,0	136
Artibonite	4,2	19,5	1,9	74,4	100,0	70,9	75,2	525
Centre	5,0	25,4	5,8	63,7	100,0	55,2	69,1	245
Ouest	0,1	24,5	1,1	74,3	100,0	70,4	73,0	466
Sud	2,2	28,4	1,9	67,5	100,0	61,7	68,1	241
Sud-Est	3,0	10,2	1,4	85,4	100,0	77,6	84,2	160
Grande-Anse	2,6	11,6	2,1	83,7	100,0	74,8	82,7	207
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	5,0	32,9	1,7	60,5	100,0	51,0	61,3	531
Alphabét./Primaire	2,5	23,7	2,1	71,7	100,0	65,8	72,0	1 536
Secondaire ou plus	0,3	5,1	1,9	92,7	100,0	86,4	90,9	1 104
<b>Ensemble des hommes</b>	2,2	18,7	2,0	77,1	100,0	70,5	76,8	3 171

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

<sup>2</sup> Ont déclaré connaître ce moyen après qu'une question spécifique ait été posée sur ce moyen.

## 1.2 CONNAISSANCE DE CERTAINS MODES DE TRANSMISSION DU VIH/SIDA

La notion selon laquelle une personne apparemment en bonne santé peut avoir le VIH/Sida est connue par 71 % des femmes interrogées (tableau 1.4.1). Le niveau de réponse est influencé par le groupe d'âges, le milieu de résidence, le département et surtout par le niveau d'instruction : en effet, 85 % des femmes de niveau secondaire ou plus pensent qu'une personne apparemment en bonne santé peut avoir le VIH/Sida, contre seulement 53 % de celles sans instruction.

Tableau 1.4.1 Connaissance de certains modes de transmission par les femmes

Répartition (en %) des femmes selon leur opinion sur l'apparence des personnes vivant avec le VIH/Sida, sur la transmission du VIH/Sida par sorcellerie et selon leur connaissance de la transmission du VIH/Sida mère/enfant et pourcentage connaissant quelqu'un ayant le VIH/Sida ou mort du VIH/Sida, par caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH/Sida			Le VIH/Sida peut être transmis par sorcellerie			Transmission mère/enfant				Pourcentage connaissant une personne ayant le VIH/Sida morte du VIH/Sida	Effectif de femmes
	Non	Oui	NSP <sup>1</sup>	Non	Oui	NSP <sup>1</sup>	Non	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Durant l'allaitement	NSP <sup>1</sup>	
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	21,0	62,5	16,5	51,5	17,7	30,8	10,7	64,2	52,1	59,0	18,7	1 211
20-24	13,2	74,7	12,1	57,9	18,5	23,6	6,4	76,0	61,1	65,0	14,4	961
25-29	7,3	79,1	13,7	55,9	17,5	26,6	5,2	75,4	60,7	62,5	16,3	770
30-39	9,7	73,7	16,6	44,4	24,0	31,6	9,6	66,5	54,2	57,7	21,1	1 278
40-49	15,7	67,3	17,0	40,1	20,9	39,0	9,2	63,2	50,9	54,0	25,5	942
<b>État matrimonial</b>												
Jamais en union	15,2	70,3	14,5	53,3	18,1	28,6	7,1	70,4	59,5	64,5	16,5	1 615
Union avec cohabitation	12,7	70,7	16,5	46,3	21,3	32,4	10,9	64,5	50,9	54,4	22,6	2 537
Union sans cohabitation	15,4	71,8	12,8	53,9	21,0	25,2	4,7	77,7	65,5	69,2	13,7	466
Union rompue	12,6	72,7	14,7	49,4	18,2	32,4	5,3	73,2	55,0	59,1	18,1	544
<b>Milieu de résidence</b>												
Aire Métropolitaine	9,1	81,6	9,2	49,0	25,7	25,3	5,5	79,9	66,9	69,4	12,1	1 770
Autre urbain	10,8	77,1	12,1	54,2	17,9	27,9	6,4	73,7	55,8	60,0	15,3	594
Ensemble urbain	9,5	80,5	10,0	50,3	23,7	25,9	5,7	78,4	64,1	67,1	12,9	2 364
Rural	17,3	62,8	19,9	48,8	16,8	34,4	11,0	60,1	48,0	53,0	24,9	2 798
<b>Département</b>												
Aire Métropolitaine	9,1	81,6	9,2	49,0	25,7	25,3	5,5	79,9	66,9	69,4	12,1	1 770
Nord	15,4	65,4	19,3	45,1	20,0	34,9	8,2	60,3	45,7	52,3	28,2	438
Nord-Est	16,0	71,4	12,6	53,6	15,2	31,2	12,3	68,6	51,5	60,2	15,4	173
Nord-Ouest	13,5	62,8	23,6	46,4	17,3	36,3	4,8	66,5	48,9	53,5	26,8	183
Artibonite	18,9	54,1	26,9	46,9	12,0	41,1	11,1	53,1	45,1	47,9	31,8	813
Centre	10,6	71,0	18,4	55,4	16,4	28,3	8,5	58,7	36,6	47,4	26,3	350
Ouest	16,6	74,1	9,3	51,5	19,2	29,3	11,9	69,6	56,9	60,7	14,9	613
Sud	14,9	67,8	17,4	45,6	23,8	30,6	10,0	68,7	55,2	58,4	18,4	327
Sud-Est	20,9	58,2	20,9	51,2	16,8	31,9	9,9	60,8	50,1	52,1	22,2	238
Grande-Anse	14,1	72,7	13,1	58,2	15,9	25,9	11,4	70,6	59,1	64,1	13,2	256
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	17,5	53,4	29,1	45,2	14,3	40,5	15,5	48,5	41,6	43,0	33,4	1 273
Alphabét./Primaire	15,0	71,6	13,4	46,6	22,8	30,7	8,2	68,6	54,0	59,7	19,5	2 444
Secondaire ou plus	8,3	85,1	6,6	58,2	20,2	21,5	3,0	85,9	69,8	73,4	6,9	1 445
Ensemble des femmes	13,7	70,9	15,4	49,5	20,0	30,5	8,5	68,5	55,4	59,4	19,4	5 161

<sup>1</sup> Comprend les femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

Une femme sur cinq (20 %) a affirmé que le VIH/Sida pouvait être transmis par sorcellerie, alors que 31 % ne savent pas. Seulement la moitié des femmes ont déclaré que le VIH/Sida ne pouvait pas être transmis par sorcellerie. Bien que les pourcentages de femmes ayant une idée correcte en la matière présentent certaines variations selon les différentes caractéristiques, même parmi les femmes les plus éduquées, seulement 58 % affirment que le VIH/Sida ne peut pas être transmis par sorcellerie.

La transmission du VIH/Sida de la mère à l'enfant (transmission verticale) n'est pas connue par environ une femme sur cinq (19 %). De façon spécifique, c'est la transmission durant la grossesse qui est la mieux connue (69 %), suivie par la transmission au cours de l'allaitement (60 %) et de celle pendant l'accouchement (55 %). Les femmes de 20-29 ans sont les mieux informées sur la transmission verticale, il en est de même de celles en union sans cohabitation, de celles de l'Aire Métropolitaine et des autres villes, des femmes de la Grande-Anse, de l'Ouest, et du Nord-Est, ainsi que des femmes de niveau d'instruction secondaire.

Un tiers des enquêtées connaissait une personne ayant le VIH/Sida ou qui en est morte (34 %). À signaler que ce sont les jeunes de 20-24 ans qui connaîtraient le plus fréquemment des personnes vivant avec le VIH/Sida ou morte de cette maladie. Il en est de même des célibataires, des femmes du milieu urbain, du Sud, de la Grande-Anse et de celles de niveau d'instruction secondaire ou plus (48 %).

La majorité des hommes (80 %) savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être infecté par le VIH/Sida (tableau 1.4.2). Cette notion est mieux connue par les enquêtés âgés de 20-39 ans, ceux en union sans cohabitation, ceux de l'Aire Métropolitain et ceux ayant atteint le niveau secondaire ou plus. Les moins informés sont ceux sans instruction (62 %), ceux du Nord-Ouest (62 %), du Centre (66 %) et de la Grande-Anse (70 %).

Un peu moins d'un homme sur cinq (17 %) a affirmé que le VIH/Sida pouvait être transmis par sorcellerie, alors que 26 % ne savent pas. Seulement 57 % des hommes ont déclaré que le VIH/Sida ne pouvait pas être transmis par sorcellerie. Les pourcentages d'hommes ayant une idée correcte en la matière présentent plus de variations que chez les femmes (de 42 % à 70 %), mais même parmi les hommes les plus éduqués, seulement 70 % affirment que le VIH/Sida ne peut être transmis par sorcellerie. Le département du Centre se distingue ici par un fort pourcentage d'hommes croyant que le VIH/Sida peut être transmis par sorcellerie (27 %).

Un pourcentage relativement important d'hommes (22 %, contre 19 % des femmes) ne sont pas au courant du mode de transmission verticale. Pour deux tiers des hommes (67 %) cette transmission peut se faire pendant la grossesse et pour la moitié (52 %) durant l'allaitement et, pour 47 % pendant l'accouchement. Les variations du niveau de connaissance de ce type de mode de transmission selon les caractéristiques socio-démographiques sont plus ou moins identiques à celles qui ont été décrites précédemment, les hommes du milieu urbain et ceux les plus éduqués étant les mieux informés.

À peu près la même proportion d'hommes que de femmes connaissaient une personne ayant le VIH/Sida ou qui en est morte (32 % contre 34 %). À signaler que ce sont les hommes de Port-au-Prince qui connaîtraient le plus fréquemment des personnes vivant avec le VIH/Sida ou morte de cette maladie (44 %). Il en est de même des hommes de niveau d'instruction secondaire ou plus (44 %).



Tableau 1.4.2 connaissance de certains modes de transmission par les hommes

Répartition (en %) des hommes selon leur opinion sur l'apparence des personnes vivant avec le VIH/Sida, sur la transmission du VIH/Sida par sorcellerie et selon leur connaissance de la transmission du VIH/Sida mère/enfant et pourcentage connaissant quelqu'un ayant le VIH/Sida ou mort du VIH/Sida, par caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH/Sida			Le VIH/Sida peut être transmis par sorcellerie			Transmission mère/enfant					Pourcentage connaissant une personne ayant le VIH/Sida morte du VIH/Sida	Effectif d'hommes
	Non	Oui	NSP <sup>1</sup>	Non	Oui	NSP <sup>1</sup>	Non	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Durant l'allaitement	NSP <sup>1</sup>		
<b>Groupe d'âges</b>													
15-19	10,9	70,9	18,2	52,9	16,8	30,3	8,5	61,9	41,9	48,9	25,0	34,3	768
20-24	5,6	88,9	5,5	68,3	14,8	17,0	9,4	76,1	54,1	58,5	10,9	29,9	512
25-29	6,1	86,5	7,3	61,7	15,5	22,8	9,6	69,1	56,6	58,5	19,3	32,2	448
30-39	7,2	83,5	9,3	59,7	19,2	21,1	5,4	69,9	47,8	52,7	19,2	32,7	589
40-49	8,5	80,4	11,1	54,2	19,7	26,1	5,5	64,3	40,1	46,6	27,5	33,7	282
50-59	5,6	72,6	21,8	48,3	17,8	33,9	6,9	60,3	43,8	47,9	30,5	27,0	571
<b>État matrimonial</b>													
Jamais en union	8,7	77,8	13,5	59,6	15,3	25,2	8,2	65,4	47,2	54,0	21,2	34,3	1 441
Union avec cohabitation	6,7	79,8	13,5	53,1	19,4	27,5	5,5	67,4	48,3	52,5	24,7	29,8	1 430
Union sans cohabitation	5,8	90,9	3,3	70,2	20,2	9,6	11,5	77,4	38,7	40,4	9,2	32,0	118
Union rompue	5,8	83,6	10,6	62,3	12,8	24,9	17,9	63,2	44,6	41,6	16,3	24,4	182
<b>Milieu de résidence</b>													
Aire Métropolitaine	3,6	94,8	1,6	62,1	18,2	19,7	5,8	78,9	59,4	60,2	11,0	44,4	811
Autre urbain	8,6	82,8	8,6	65,2	16,2	18,6	6,0	76,7	57,9	60,1	12,1	35,6	356
Ensemble urbain	5,1	91,1	3,8	63,0	17,6	19,3	5,9	78,2	58,9	60,2	11,4	41,7	1 166
Rural	8,9	72,7	18,3	53,8	16,9	29,3	8,7	59,9	40,4	47,4	28,3	25,7	2 005
<b>Département</b>													
Aire Métropolitaine	3,6	94,8	1,6	62,1	18,2	19,7	5,8	78,9	59,4	60,2	11,0	44,4	811
Nord	7,8	75,7	16,5	56,9	14,4	28,7	7,9	64,5	41,8	50,0	24,3	26,9	280
Nord-Est	10,2	76,1	13,7	50,9	16,5	32,6	7,4	69,4	52,0	57,2	19,6	31,1	100
Nord-Ouest	12,7	61,6	25,7	49,2	13,0	37,7	5,0	60,0	43,6	52,6	29,7	30,2	136
Artibonite	4,8	76,1	19,1	64,5	11,7	23,8	9,0	51,4	30,8	34,2	36,5	18,0	525
Centre	13,5	65,6	20,9	42,3	26,8	30,9	8,9	60,9	48,1	58,9	26,8	28,0	245
Ouest	9,6	79,8	10,6	54,0	17,9	28,1	10,1	68,3	41,1	51,8	18,7	36,4	466
Sud	12,8	75,1	12,1	52,5	22,7	24,8	8,6	69,1	48,1	49,2	18,7	28,9	241
Sud-Est	4,8	76,7	18,5	62,7	16,1	21,2	5,0	66,9	66,9	64,2	23,9	24,3	160
Grande-Anse	9,0	70,0	20,9	54,1	15,0	30,9	6,9	63,4	45,2	52,6	26,4	26,0	207
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucun	9,5	61,7	28,8	48,5	16,3	35,3	9,3	47,3	34,4	38,6	42,1	16,1	531
Alphabét./Primaire	10,1	75,0	14,9	50,8	19,5	29,6	8,4	63,3	44,5	51,5	24,7	28,0	1 536
Secondaire ou plus	3,0	94,4	2,6	70,2	14,3	15,4	5,7	80,6	57,2	59,5	8,8	44,1	1 104
Ensemble des hommes	7,5	79,5	13,0	57,2	17,2	25,6	7,7	66,6	47,2	52,1	22,1	31,6	3 171

<sup>1</sup> Comprend les hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

### 1.3 PERCEPTION DU RISQUE DE CONTRACTER LE VIH/SIDA

La perception du risque que l'on court de contracter le VIH/Sida est sans nul doute un facteur important qui conditionne l'adoption ou non de comportements sécuritaires. Cette section présente les résultats concernant la perception des enquêtés de leurs niveaux de risque et surtout les raisons avancées pour expliquer cette perception.

En général les femmes et les hommes interrogés estiment, dans leur très grande majorité (respectivement 81 % et 84 %) qu'ils ne courent aucun risque de contracter le VIH/Sida. Quel que soit le sexe, cette opinion est davantage exprimée par les plus jeunes (15-19 ans), les célibataires, ceux n'ayant pas eu de partenaire dans les douze derniers mois (tableau 1.5). Par ailleurs, 10 % des femmes et 9 % des hommes pensent courir des risques minimes, et 9 % des femmes et 7 % des hommes des risques modérés ou importants.

Tableau 1.5 Perception du niveau de risque de contracter le VIH/Sida

Pourcentage de femmes et d'hommes connaissant le VIH/Sida par perception du niveau de risque de contracter le VIH/Sida, par caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Femmes						Hommes					
	Risques de contracter le VIH/Sida					Effectif de femmes	Risques de contracter le VIH/Sida					Effectif d'hommes
	Aucun	Minimes	Modérés	Importants	Total <sup>1</sup>		Aucun	Minimes	Modérés	Importants	Total <sup>1</sup>	
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	93,0	3,5	2,6	0,6	100,0	1 171	93,5	3,2	2,0	0,6	100,0	727
20-24	80,1	8,7	7,9	3,1	100,0	938	81,8	13,7	2,6	1,6	100,0	510
25-29	75,3	13,3	6,7	4,1	100,0	753	81,3	11,5	5,2	1,6	100,0	444
30-39	73,5	14,8	9,1	2,5	100,0	1 240	74,9	9,0	11,5	2,7	100,0	584
40-49	80,9	10,3	6,9	1,8	100,0	919	74,6	16,2	7,9	0,6	100,0	281
50-59	-	-	-	-	-	-	87,0	6,5	5,4	1,0	100,0	555
<b>État matrimonial</b>												
Jamais en union	90,8	5,5	2,3	1,1	100,0	1 569	88,7	6,5	3,1	1,1	100,0	1 390
Actuel. en union	74,3	12,9	9,7	3,0	100,0	2 922	81,4	9,6	6,7	1,5	100,0	1 531
- Union avec cohabitation	77,2	12,3	7,3	3,1	100,0	2 466	81,9	9,5	6,3	1,5	100,0	1 413
- Union sans cohabitation	58,4	16,1	23,0	2,5	100,0	456	75,5	10,5	11,6	1,2	100,0	118
Union rompue	88,3	7,5	2,2	2,0	100,0	530	60,6	22,8	13,6	2,2	100,0	181
<b>Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois</b>												
0	93,9	3,5	1,9	0,5	100,0	1 635	96,6	2,3	0,4	0,0	100,0	730
1	75,0	12,9	8,9	3,1	100,0	3 337	89,7	5,8	3,0	0,7	100,0	1 649
2+	51,8	27,3	10,9	10,1	100,0	48	56,2	23,1	16,3	4,3	100,0	722
<b>Milieu de résidence</b>												
Aire Métropolitaine	81,9	8,9	6,7	2,3	100,0	1 749	83,5	9,7	5,0	1,1	100,0	806
Autres urbain	74,9	13,6	7,7	3,4	100,0	581	81,6	8,8	6,2	2,8	100,0	352
Ensemble urbain	80,2	10,1	6,9	2,6	100,0	2 329	82,9	9,4	5,3	1,6	100,0	1 159
Rural	81,6	9,9	6,4	2,1	100,0	2 692	83,8	8,7	5,6	1,2	100,0	1 943
<b>Département</b>												
Aire Métropolitaine	81,9	8,9	6,7	2,3	100,0	1 749	83,5	9,7	5,0	1,1	100,0	806
Nord	80,1	12,5	5,6	1,8	100,0	423	88,6	7,4	2,1	2,0	100,0	276
Nord-Est	83,0	10,5	4,8	1,7	100,0	172	83,3	6,4	7,2	2,8	100,0	97
Nord-Ouest	83,5	11,0	2,3	1,8	100,0	175	85,8	3,9	9,4	0,9	100,0	129
Artibonite	76,4	13,1	8,5	2,0	100,0	757	78,3	13,1	6,8	0,9	100,0	502
Centre	75,1	11,5	6,7	6,6	100,0	337	85,1	10,5	2,5	0,2	100,0	232
Ouest	87,0	5,4	6,8	0,9	100,0	605	85,3	4,2	8,5	1,7	100,0	465
Sud	78,3	11,5	6,3	3,3	100,0	318	83,5	10,9	4,1	1,1	100,0	236
Sud-Est	84,7	7,1	6,0	2,2	100,0	231	81,9	9,4	3,6	3,3	100,0	155
Grande-Anse	78,6	12,8	7,2	1,3	100,0	255	83,1	9,0	5,3	1,7	100,0	202
Ensemble	80,9	10,0	6,6	2,3	100,0	5 021	83,5	9,0	5,5	1,4	100,0	3 102

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

La perception du risque augmente de façon significative avec le nombre de partenaires dans les douze derniers mois. Ainsi, moins d'un pour cent des hommes et 2 % des femmes n'ayant eu aucun partenaire dans les 12 derniers mois pensent courir des risques modérés ou importants, contre 21 % des hommes et des femmes qui ont eu deux partenaires sexuels ou plus au cours de l'année. Ce sont les femmes de 25-39 ans qui pensent le plus fréquemment courir des risques, quels qu'ils soient (environ 25 %) ; chez les hommes, ce sont ceux de 30-49 ans (25 %). Par ailleurs, on constate une proportion plus élevée de femmes en union sans cohabitation que d'hommes dans le même type d'union à avoir déclaré être à risque modéré ou important (26 % contre 13 %). Par contre, les hommes en union rompue estiment plus fréquemment que les femmes être à risque modéré ou important (16 % contre 4 %). On ne constate que peu de variation de la perception du risque selon le milieu de résidence et le département.

Parmi les femmes et les hommes qui ont déclaré ne courir aucun risque ou qu'un risque minime de contracter le VIH/Sida, une forte proportion (respectivement, 47 % et 46 %) ont justifié leur perception par le fait qu'ils n'avaient qu'un seul partenaire (tableau 1.6) ; 27 % des femmes et 25 % des hommes ont cité comme raison l'abstinence sexuelle. L'utilisation du condom a été citée par 16 % des hommes mais que par 3 % des femmes; par contre, 17 % de ces dernières ont évoqué comme raison d'être à risque nul ou minime le fait que leur partenaire était fidèle (contre 8 % des hommes). Environ un homme sur dix (9 %) a déclaré que c'est parce qu'il évitait les prostituées.

Tableau 1.6 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le VIH/Sida sont perçus comme nuls/minimes

Parmi les femmes et les hommes qui pensent ne courir aucun risque ou courir des risques minimes de contracter le VIH/Sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial, EMMUS-III Haïti 2000

	S'abstient de rapports sexuels	Utilise le condom	Un seul parten- naire	Limite nombre de parten- naires	Conjoint n'a pas autre parten- naire	Évite les prostitu- ées	Évite rapports sexuels avec personne ayant multiples partenaires	Évite de partager lames/ rasoirs	Autres	Ne sait pas	Effectif
<b>Femmes</b>											
Jamais en union	61,4	4,4	14,3	3,8	4,3	-	1,4	7,0	16,9	5,9	1 510
Actuel. en union	1,1	1,8	70,8	13,5	27,1	-	3,7	2,2	6,6	3,4	2 546
- Union avec cohabitation	1,2	1,0	72,2	13,1	29,2	-	2,9	2,1	6,1	3,4	2 206
- Union sans cohabitation	0,6	6,7	62,1	16,1	13,7	-	8,6	3,0	9,8	3,5	340
Union rompue	57,3	3,4	24,9	11,1	5,0	-	3,5	5,2	14,9	1,6	508
Ensemble des femmes	27,3	2,8	47,0	10,0	17,1	-	2,9	4,1	10,9	4,0	4 564
<b>Hommes</b>											
Jamais en union	48,3	23,7	21,0	8,9	3,3	8,6	6,7	9,8	7,1	1,9	1 324
Actuel. en union	1,3	9,2	72,1	15,5	12,7	7,5	6,1	4,1	6,9	0,5	1 393
- Union avec cohabitation	1,3	7,4	75,7	15,6	12,7	7,0	4,6	4,3	6,1	0,5	1 292
- Union sans cohabitation	0,8	32,0	26,0	14,6	12,8	13,6	25,4	1,7	16,9	0,0	101
Union rompue	33,4	18,8	17,4	15,8	1,9	27,1	18,7	6,3	7,1	0,4	151
Ensemble des hommes	24,7	16,4	45,6	12,5	7,8	9,0	7,0	6,9	7,0	1,1	2 867

Tableau 1.7 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le VIH/Sida sont perçus comme modérés/importants

Parmi les femmes et les hommes qui pensent avoir des risques modérés/importants de contracter le VIH/Sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial, EMMUS-III Haïti 2000

	N'utilise pas le condom	Plus d'un partenaire sexuel	A de nombreux partenaires	Partenaire infidèle	Se prostitue/ fréquente prostituées	A des rapports avec personnes ayant partenaires	A des injections	Est piqué par des moustiques	Partage lames/ rasoirs	Autres	Ne sait pas	Effectif
<b>Femmes</b>												
Jamais en union	(14,8)	(10,1)	(5,2)	(34,0)	(0,0)	(3,6)	(33,9)	(12,8)	(18,4)	(15,7)	(2,6)	54
Actuel. en union	16,3	16,8	1,9	72,1	0,3	9,7	1,3	2,9	2,1	1,4	0,5	372
- Union avec cohabitation	18,0	12,3	2,2	73,1	0,4	6,4	1,6	4,2	2,7	1,4	0,7	256
- Union sans cohabitation	12,6	26,8	1,3	69,9	0,0	16,8	0,7	0,0	0,8	1,3	0,0	116
Union rompue	(21,2)	(17,4)	(9,8)	(40,2)	(0,0)	(3,1)	(25,0)	(6,2)	(17,2)	(7,6)	(0,0)	22
Ensemble des femmes	16,4	16,1	2,7	66,0	0,2	8,6	6,4	4,2	4,8	3,4	0,7	448
<b>Hommes</b>												
Jamais en union	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59
Actuel. en union	33,0	29,5	53,5	3,6	5,4	1,1	0,0	11,3	3,1	2,4	0,0	126
- Union avec cohabitation	30,6	26,7	56,1	2,9	5,7	0,8	0,0	12,6	3,6	2,7	0,0	110
- Union sans cohabitation	50,4	49,8	35,0	8,9	3,2	2,8	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	15
Union rompue	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29
Ensemble des hommes	42,4	23,7	42,5	13,5	7,5	2,8	1,7	8,6	5,8	3,6	0,0	213

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Il apparaît que la fréquence des différentes raisons citées varie en fonction de l'état matrimonial. L'abstinence sexuelle est la raison qui a été évoquée le plus souvent par les femmes et les hommes célibataires et ceux en union rompue. Par contre, l'unipartenariat est la réponse la plus fréquente des femmes et des hommes en union, en particulier ceux et celles en union avec cohabitation. Il faut également signaler que l'utilisation du condom a été surtout citée par les hommes célibataires (24 %) et ceux en union sans cohabitation (32 %).

Parmi ceux qui ont déclaré courir des risques modérés ou importants de contracter le VIH/Sida, les raisons citées pour justifier cette perception varient selon le sexe (tableau 1.7). La principale raison citée par les femmes est le fait que leur partenaire est infidèle (66 %, contre 14 % par les hommes), suivi par la non utilisation du condom (16 %) et le multipartenariat (16 %). Chez les hommes, la raison principale est le fait d'avoir de nombreuses partenaires (43 %, contre 3 % des femmes), la non utilisation du condom (42 %) et le fait d'avoir plus d'une partenaire sexuelle (24 %). Chez les hommes, le multipartenariat est mentionné principalement par ceux en union avec cohabitation, et la non utilisation du condom par les hommes en union sans cohabitation. Chez les femmes, l'infidélité du partenaire est citée principalement par les femmes en union, et le multipartenariat par celles en union sans cohabitation.

#### **1.4 COMPORTEMENT POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE VIH/SIDA**

L'adoption d'un comportement sécuritaire est un élément clé dans la prévention de l'infection au VIH/Sida. Au cours de l'EMMUS-III, il était donc important d'évaluer si les enquêtés avaient changé leur comportement et quels nouveaux types de comportement ils avaient adoptés.

Parmi les femmes ayant entendu parler du VIH/Sida, plus d'une sur deux (56 %) ont déclaré n'avoir pas changé de comportement sexuel depuis qu'elles avaient entendu parler de cette maladie (tableau 1.8.1). Cette proportion est particulièrement élevée chez les femmes se considérant à risque modéré ou élevé de contracter le VIH/Sida (respectivement, 81 % et 71 %) : c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas changé de comportement sexuel qu'elles se considèrent à risque. Les femmes qui n'ont pas changé de comportement sont, proportionnellement, plus nombreuses en milieu rural (61 %), et dans les départements de l'Artibonite (73 %), du Sud-Est (65 %) du Nord (62 %) et du Sud (61 %).

Lorsque les femmes ont changé de comportement, c'est avant tout en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire (27 %), suivi de l'abstinence sexuelle (11 %) et de l'invitation faite au partenaire d'être fidèle (10 %). L'utilisation du condom n'est citée que par 3 % des femmes. La limitation des rapports à un seul partenaire concerne plus particulièrement les femmes qui estiment ne courir aucun risque ou un faible risque de contracter le VIH/Sida, celles vivant en union, celles du milieu urbain et du département de l'Ouest. L'abstinence sexuelle est un changement de comportement qui a été plus particulièrement cité par les femmes célibataires ou en union rompue, celles résidant en milieu urbain et dans le département de l'Ouest. Enfin, l'initiation à l'utilisation du condom est citée dans une proportion relativement plus importante par les femmes qui pensent avoir un risque élevé de contracter le VIH/Sida (9 %), celles en union sans cohabitation (6 %) et celles du milieu urbain (4 %).

Un tiers des hommes qui ont entendu parler du VIH/Sida ont déclaré ne pas avoir changé de comportement sexuel depuis qu'ils ont entendu parler de cette maladie (tableau 1.8.2). Les hommes qui n'ont pas changé de comportement sont surtout, comme chez les femmes, ceux qui se considèrent à risque modéré ou élevé de contracter le VIH/Sida (respectivement, 66 % et 71 %).

Tableau 1.8.1 Comportement des femmes pour éviter de contracter le VIH/Sida

Pourcentage de femmes qui ont entendu parler du VIH/Sida et qui ont changé de comportement pour éviter de contracter le VIH/Sida selon la perception du risque qu'elles ont du VIH/Sida et certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pas de change-ment de compor-tement sexuel	Changement du comportement sexuel								NSP	Effectif
		Abstinence sexuelle	A commencé à utiliser le condom	A limité rapports à 1 seul partenaire	A limité le nombre de partenaires sexuelles	A demandé au partenaire d'être fidèle	Autres changements sexuels	Évite les injections	Autres changements non sexuels		
<b>Perception du risque</b>											
Pas de risque	52,8	13,1	2,3	29,1	4,6	10,4	0,6	1,8	5,8	0,1	4 063
Risque faible	58,3	3,0	5,6	26,5	6,9	7,8	0,5	1,8	4,9	0,0	501
Risque modéré	80,5	1,2	3,0	12,8	2,6	3,2	0,1	2,6	2,3	0,0	333
Risque élevé	71,0	3,4	9,4	10,9	11,4	3,9	0,8	1,2	0,5	0,0	115
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union	58,2	27,8	4,1	11,5	1,8	2,4	0,4	3,8	10,0	0,2	1 569
Union avec cohabitation	54,1	0,5	1,6	38,6	5,4	13,6	0,5	1,0	3,1	0,0	2 466
Union sans cohabitation	56,5	0,1	5,8	31,7	9,9	12,1	0,1	1,5	1,5	0,0	456
Union rompue	54,3	19,8	3,0	17,6	6,8	9,5	1,9	0,5	5,7	0,0	530
<b>Milieu de résidence</b>											
Aire Métropolitaine	47,0	15,1	3,8	30,8	4,6	10,1	0,7	2,9	7,5	0,1	1 749
Autre urbain	51,7	15,5	5,7	25,3	4,4	5,0	0,9	3,2	7,6	0,1	581
Ensemble urbain	48,2	15,2	4,2	29,5	4,6	8,8	0,8	3,0	7,5	0,1	2 329
Rural	62,1	7,5	1,7	25,4	5,0	10,1	0,4	0,9	3,5	0,0	2 692
<b>Département</b>											
Aire Métropolitaine	47,0	15,1	3,8	30,8	4,6	10,1	0,7	2,9	7,5	0,1	1 749
Nord	61,9	8,6	3,0	24,9	8,2	6,3	0,5	1,0	5,2	0,0	423
Nord-Est	57,8	12,2	2,6	26,3	4,1	5,9	0,3	4,1	5,7	0,0	172
Nord-Ouest	59,6	11,8	2,0	22,9	4,8	5,0	1,9	4,4	7,5	0,2	175
Artibonite	73,3	4,4	1,7	20,9	3,5	11,3	0,3	1,1	1,2	0,0	757
Centre	59,4	3,7	5,6	26,4	6,9	5,0	0,5	0,2	2,7	0,0	337
Ouest	44,6	15,4	1,2	33,0	5,5	18,3	0,2	1,0	6,0	0,0	605
Sud	61,1	9,4	2,9	23,9	2,0	6,2	0,8	1,3	5,5	0,0	318
Sud-Est	65,3	6,7	0,7	24,1	2,3	5,0	0,6	0,7	3,8	0,0	231
Grande-Anse	53,4	11,4	3,4	24,5	6,3	4,6	0,8	1,0	5,0	0,2	255
Ensemble des femmes <sup>1</sup>	55,6	11,1	2,9	27,3	4,8	9,5	0,6	1,9	5,4	0,1	5 021

<sup>1</sup> Y compris 9 cas pour lesquels la perception du risque de contracter le VIH/Sida est indéterminée.



Tableau 1.8.2. Comportement des hommes pour éviter de contracter le VIH/Sida

Pourcentage d'hommes qui ont entendu parler du VIH/Sida et qui ont changé de comportement pour éviter de contracter le VIH/Sida selon la perception du risque qu'ils ont du VIH/Sida et certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pas de changement de comportement sexuel	Changement du comportement sexuel							NSP	Effectif
		Abstinence sexuelle	A commencé à utiliser le condom	A limité rapports à 1 seul partenaire	A limité le nombre de partenaires sexuels	A demandé à la partenaire d'être fidèle	Autres changements sexuels	Évite les injections		
<b>Perception du risque</b>										
Pas de risque	29,1	12,7	16,6	39,3	7,4	4,7	9,3	1,6	0,0	2 589
Risque faible	25,9	2,8	25,3	19,6	25,1	8,1	26,7	1,5	0,0	278
Risque modéré	66,3	1,7	11,0	12,8	10,2	3,1	9,1	0,5	0,0	170
Risque élevé	71,0	0,0	23,6	9,7	3,3	0,0	5,3	0,0	0,0	42
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union	37,3	21,9	23,7	14,9	7,0	2,5	11,2	1,7	0,1	1 390
Union avec cohabitation	24,7	0,4	9,6	60,5	10,1	7,4	7,9	1,5	0,0	1 413
Union sans cohabitation	18,7	1,2	31,0	22,0	15,5	9,4	32,3	1,3	0,0	118
Union rompue	47,3	16,3	16,5	10,1	12,6	0,0	15,3	0,0	0,0	181
<b>Milieu de résidence</b>										
Aire Métropolitaine	22,0	13,2	31,5	33,7	13,2	7,4	10,0	1,4	0,0	806
Autre urbain	23,4	15,9	25,8	31,9	11,1	3,3	13,1	3,6	0,0	352
Ensemble urbain	22,4	14,0	29,8	33,1	12,6	6,1	11,0	2,1	0,0	1 159
Rural	36,8	9,2	9,6	37,2	6,9	4,1	10,6	1,1	0,0	1 943
<b>Département</b>										
Aire Métropolitaine	22,0	13,2	31,5	33,7	13,2	7,4	10,0	1,4	0,0	806
Nord	36,3	10,2	12,9	38,4	11,2	4,1	6,4	0,5	0,3	276
Nord-Est	37,4	9,2	17,5	29,8	12,3	2,9	17,0	2,2	0,0	97
Nord-Ouest	45,4	9,3	12,9	26,4	7,2	3,2	19,7	2,1	0,0	129
Artibonite	36,2	7,2	8,2	39,2	3,3	1,6	12,7	0,1	0,0	502
Centre	14,8	12,1	11,7	48,8	9,4	0,7	13,4	6,4	0,0	232
Ouest	36,1	11,0	13,7	34,5	5,4	10,7	10,8	1,5	0,0	465
Sud	37,0	8,4	14,3	32,6	7,0	2,6	10,0	0,7	0,0	236
Sud-Est	28,7	15,7	9,5	37,4	9,9	3,6	8,1	1,7	0,0	155
Grande-Anse	42,9	12,7	13,5	29,7	13,2	1,0	5,4	0,6	0,0	202
Ensemble des hommes <sup>1</sup>	31,4	11,0	17,1	35,7	9,0	4,9	10,7	1,5	0,0	3 102

<sup>1</sup> Y compris 9 cas pour lesquels la perception du risque de contracter le VIH/Sida est indéterminée.

Les hommes qui n'ont pas changé de comportement sont, proportionnellement, plus nombreux chez ceux en union rompue (47 %), ceux du milieu rural (37 %), et dans les départements du Nord-Ouest (45 %) et de la Grande-Anse (43 %).

Lorsque les hommes ont changé de comportement, c'est avant tout, comme pour les femmes, en limitant les rapports sexuels à une seule partenaire (36 %), suivi par l'utilisation du condom (17 %) et par l'abstinence sexuelle (11 %). La limitation des rapports à une seule partenaire concerne plus particulièrement les hommes qui estiment ne courir aucun risque de contracter le VIH/Sida, ceux vivant en union avec cohabitation, et ceux du département du Centre. L'abstinence sexuelle est un changement de comportement qui a été plus particulièrement cité par les hommes célibataires ou en union rompue, ceux résidant en milieu rural et dans le département du Nord-Ouest et de la Grande-Anse. Enfin, l'initiation à l'utilisation du condom est citée dans une proportion relativement plus importante par les hommes en union sans cohabitation (31 %), les célibataires (24 %) et ceux du milieu urbain (30 %).

### 1.5 ASPECT SOCIAL DE LA PRÉVENTION/PRISE EN CHARGE DU VIH/SIDA

Sous l'expression « aspect social de la prévention et de la prise en charge du VIH/Sida », ont été regroupés différents sujets, à savoir, la confidentialité sur la séropositivité, la prise en charge du malade par des proches, l'autorisation de travailler pour des personnes séropositives et l'éducation des enfants de 12-14 ans sur l'utilisation du condom.

Un très faible pourcentage de femmes interviewées (12 %) estiment qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait pouvoir garder son état secret (tableau 13.9.1). Cette très faible proportion de femmes favorables à la confidentialité de l'état de santé des malades est encore plus faible parmi les enquêtés de 30-39 ans (10 %), celles en union sans cohabitation (9 %), et celles vivant dans les départements du Nord-Est (7 %), du Nord-Ouest (10 %) et de la Grande-Anse (9 %). Par contre, et de manière surprenante, on ne constate pas de différences significatives en fonction du milieu de résidence et en fonction du niveau d'instruction.

À la question de savoir si, dans le cas où, quelqu'un de sa famille contractait le VIH/Sida, l'interviewée serait prête à en prendre soin chez elle, seulement un tiers des enquêtées ont répondu par l'affirmative (35 %). Cette attitude est légèrement plus fréquente parmi les 15-19 ans, les célibataires, les femmes vivant dans la capitale, dans le département du Nord-Est et chez les femmes de niveau d'instruction secondaire et plus. Cependant, même dans ces sous-populations, moins de 45 % des femmes seraient prêtes à prendre soin, chez elles, d'un membre de la famille malade.

Environ une femme enquêtée sur cinq (21 %) estime qu'une personne avec le VIH/Sida devrait pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes et plus des deux tiers pensent que cette personne ne devrait pas être autorisée à garder son emploi. Les femmes qui admettent le moins fréquemment que les malades devraient être autorisés à travailler sont les plus jeunes (17 %), celles du milieu rural (16 %) et celles de faible niveau d'instruction.

Une femme sur deux (49 %) estime que les enfants de 12-14 ans devraient être éduqués sur l'utilisation du condom. Cette position est surtout partagée par les 20-24 ans, les célibataires, les femmes en union sans cohabitation ou en union rompue, celles du milieu urbain, celles des départements du Nord-Est et du Centre, et celles de niveau d'instruction secondaire ou plus.

Comme pour les femmes, une minorité d'hommes (12 %) pensent qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait être autorisée à garder son état secret (tableau 13.9.2). Cette très faible

Tableau 13.9.1 Aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida (pour les femmes)

Répartition (en %) des femmes selon leur réponse à différentes questions relatives à l'aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Une personne avec le VIH/ Sida devrait-elle pouvoir garder son état secret?		Si quelqu'un de votre famille contractait le VIH/Sida, seriez-vous prêt à en prendre soin, chez vous?		Une personne avec le VIH/Sida devrait-elle pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes?		Les enfants de 12 à 14 ans devraient-ils être éduqués sur l'utilisation du condom?		Effectif
	NSP/Ça dépend, pas sûr		NSP/Ça dépend, pas sûr		NSP/Ça dépend, pas sûr		NSP/Ça dépend, pas sûr		
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	11,3	80,4	8,3	46,5	12,6	16,9	9,5	24,0	1 211
20-24	15,5	79,4	5,0	54,1	11,0	21,7	10,8	12,9	961
25-29	12,6	78,6	8,8	54,0	13,8	21,1	11,2	20,4	770
30-39	9,7	81,7	8,6	50,9	16,8	22,0	13,1	24,3	1 278
40-49	11,4	80,1	8,5	47,8	14,9	22,0	12,9	27,3	942
<b>État matrimonial</b>									
Jamais en union	13,1	79,7	7,2	46,7	11,5	21,1	10,3	20,3	1 615
Union avec cohabitation	11,8	79,8	8,3	51,8	16,1	19,0	12,6	23,9	2 537
Union sans cohabitation	9,2	82,7	8,1	49,7	12,3	21,4	11,1	18,6	466
Jamais en union	10,8	81,6	7,6	55,1	12,3	26,1	10,5	21,8	544
<b>Milieu de résidence</b>									
Aire Métropolitaine	11,0	83,1	5,8	47,2	10,9	25,3	9,8	18,0	1 770
Autre urbain	14,8	78,5	6,7	49,2	12,8	29,1	9,8	17,5	594
Ensemble urbain	12,0	82,0	6,1	47,7	11,3	26,2	9,8	17,8	2 364
Rural	11,8	78,8	9,4	52,6	16,1	15,8	13,0	25,7	2 798
<b>Département</b>									
Aire Métropolitaine	11,0	83,1	5,8	47,2	10,9	25,3	9,8	18,0	1 770
Nord	15,8	76,3	7,9	45,2	15,5	24,1	12,1	21,8	438
Nord-Est	6,5	89,1	4,3	44,0	9,7	15,2	8,3	12,5	173
Nord-Ouest	9,6	79,5	10,9	45,2	21,0	19,3	14,0	25,2	183
Artibonite	11,9	75,5	12,6	58,1	19,5	13,4	17,5	28,4	813
Centre	13,3	77,9	8,8	55,8	15,2	23,9	12,1	16,9	350
Ouest	13,6	79,3	7,2	51,7	13,7	17,9	8,2	30,5	613
Sud	10,3	84,3	5,5	51,2	13,3	18,4	8,5	23,8	327
Sud-Est	15,8	73,8	10,4	55,9	13,6	14,5	13,1	23,6	238
Grande-Anse	9,2	82,9	7,9	47,7	12,9	20,3	13,9	18,7	256
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	12,6	73,7	13,7	50,5	22,0	13,3	18,3	36,6	1 273
Alphabét./Primaire	11,4	81,5	7,1	52,3	11,8	17,5	10,6	20,9	2 444
Secondaire ou plus	12,0	83,9	4,1	47,0	10,4	32,4	7,2	11,2	1 445
Ensemble des femmes	11,9	80,2	7,9	50,4	13,9	20,6	11,5	22,1	5 161

¹ Comprend les femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

Tableau 1.9.2 Aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida (pour les hommes)

Répartition (en %) des hommes selon leur réponse à différentes questions relatives à l'aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Une personne avec le VIH/ Sida devrait-elle pouvoir garder son état secret?		Si quelqu'un de votre famille contractait le VIH/Sida, seriez-vous prêt à en prendre soin, chez vous?		Une personne avec le VIH/Sida devrait-elle pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes?		Les enfants de 12 à 14 ans devraient-ils être éduqués sur l'utilisation du condom?		Effectif	
	NSP/Ça dépend/ pas sûr		NSP/Ça dépend/ pas sûr		NSP/Ça dépend/ pas sûr		NSP/Ça dépend/ pas sûr			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	14,4	75,5	10,0	44,0	16,0	21,2	63,7	15,1	66,7	768
20-24	12,1	82,3	5,6	49,3	7,8	26,2	66,9	6,9	71,4	512
25-29	13,0	84,4	2,6	55,6	11,8	30,2	52,8	17,0	71,2	448
30-39	6,8	88,9	4,3	44,8	13,0	31,3	59,4	9,4	58,0	589
40-49	22,1	75,5	2,4	36,9	5,5	23,1	71,1	5,8	48,4	282
50-59	9,9	82,6	7,6	39,4	16,2	21,4	63,7	14,9	49,2	571
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union	14,7	77,4	7,8	45,3	14,7	27,4	59,1	13,5	70,2	1 441
Union avec cohabitation	10,7	84,8	4,5	43,3	11,5	25,1	63,9	11,0	52,9	1 430
Union sans cohabitation	8,4	90,8	0,9	50,0	4,5	11,3	77,2	11,5	61,2	118
Jamais en union	7,8	84,1	8,1	55,8	10,3	20,2	69,1	10,6	64,3	182
<b>Milieu de résidence</b>										
Aire Métropolitaine	13,3	84,4	2,3	44,2	11,6	37,7	50,6	11,7	68,5	811
Autre urbain	13,8	82,1	4,1	47,8	8,5	32,9	60,0	7,1	69,6	356
Ensemble urbain	13,4	83,7	2,9	45,3	10,7	36,2	53,5	10,3	68,8	1 166
Rural	11,6	80,4	7,9	45,1	13,7	19,0	67,8	13,2	57,6	2 005
<b>Département</b>										
Aire Métropolitaine	13,3	84,4	2,3	44,2	11,6	37,7	50,6	11,7	68,5	811
Nord	10,7	82,6	6,7	47,8	11,0	24,8	68,5	6,8	63,9	280
Nord-Est	13,3	79,8	6,9	50,0	9,0	16,6	68,0	15,4	59,2	100
Nord-Ouest	15,2	71,2	13,6	42,0	15,1	23,3	61,4	15,3	68,1	136
Artibonite	15,2	75,0	9,9	45,3	16,7	30,0	50,8	19,2	56,9	525
Centre	7,7	79,7	12,6	45,8	14,8	16,4	73,6	10,0	58,1	245
Ouest	12,7	85,3	2,1	39,1	6,7	18,3	72,6	9,1	64,4	466
Sud	7,6	88,5	3,9	56,8	17,6	20,1	71,6	8,3	58,0	241
Sud-Est	4,4	88,5	7,1	56,8	19,1	10,6	78,1	11,3	43,6	160
Grande-Anse	17,1	74,8	8,1	35,6	8,6	15,9	70,6	13,6	57,9	207
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	14,2	74,6	11,1	42,9	19,9	14,1	67,8	18,1	47,5	531
Alphabét./Primaire	12,2	80,9	6,9	47,6	13,3	20,9	67,5	11,6	59,1	1 536
Secondaire ou plus	11,5	86,0	2,5	43,0	8,1	36,9	53,1	10,0	72,1	1 104
Ensemble des hommes	12,3	81,6	6,1	45,2	12,6	25,4	62,5	12,1	61,7	3 171

1 Comprend les hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

proportion d'hommes favorables à la confidentialité de l'état de santé des malades est encore plus faible parmi ceux âgés de 25-29 ans et de 50-59 ans, parmi les hommes en union sans cohabitation ou en union rompue, chez ceux vivant dans les départements du Centre, du Sud et du Sud-Est.

Moins de la moitié des hommes interviewés (42 %, contre 36 % des femmes) seraient prêts à prendre soin de quelqu'un de leur famille atteint du VIH/Sida. Les hommes du groupe d'âges 40-49 ans, ceux vivant en union, ceux de la Grande Anse et de l'Ouest, et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus ont exprimé cette opinion plus fréquemment que les autres.

Un quart des hommes interviewés estiment qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes (25 % contre 21 % des femmes). Cette opinion est surtout partagée par les hommes de 25-39 ans, les célibataires et les hommes en union avec cohabitation, ceux du milieu urbain, du département de l'Artibonite et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus.

Environ deux tiers des hommes interrogés (62 % contre 49 % des femmes) estiment que les enfants de 12-14 ans devraient être éduqués sur l'utilisation du condom. Les hommes de 20-29 ans, les célibataires, ceux du milieu urbain, des départements du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Centre, et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus sont, proportionnellement, les plus nombreux à partager cette opinion.

## 1.6 TEST DU VIH/SIDA

Dans toute politique de dépistage volontaire du VIH/Sida, il est important de connaître la position de la population sur la question. L'EMMUS-III a été l'occasion d'estimer la fraction de la population qui s'était déjà faite testée et, pour celle non encore testée, la fraction de la population qui désirait connaître son statut sérologique.

Une infime minorité de femmes (4 %) ont déclaré avoir été testées pour le VIH/Sida et ces tests ont surtout été effectués dans le secteur privé (2 %) (tableau 1.10.1). Ce sont, plus particulièrement, les femmes de 25-39 ans, celles en union sans cohabitation, celles du milieu urbain, et les femmes de niveau d'instruction secondaire ou plus qui se sont fait tester. Par contre, la moitié des interviewées non encore testées désireraient connaître leur statut sérologique, surtout les femmes de 20-24 ans, celles en union rompue, celles de l'Aire Métropolitaine, du département du Nord-Est et celles de niveau secondaire.

Parmi les femmes non testées, plus des trois quarts (79 %) ne connaissaient pas un endroit où se faire tester. Ainsi, une proportion importante de femmes qui souhaiteraient être testées (50 %) ne savent pas où aller pour le test. Cette méconnaissance est plus marquée parmi les 15-19 ans et les 40-49 ans, en milieu rural, dans le département du Sud-Est et parmi les femmes sans instruction.

Un très faible pourcentage d'hommes (6 %, contre 4 % des femmes) ont déclaré avoir été testés pour le VIH/Sida et ces tests ont surtout été effectués dans le secteur privé (3 %) (tableau 1.10.2). Ce sont, plus particulièrement, les hommes de 25-29 ans, ceux en union sans cohabitation, ceux de la capitale, et les hommes de niveau d'instruction secondaire ou plus qui se sont fait tester. Par contre, plus de la moitié des hommes non encore testés désireraient connaître leur statut sérologique (56 %), surtout les hommes de 20-24 ans, ceux en union sans cohabitation ou en union rompue, ceux du milieu rural et des départements du Nord-Est et de la Grande-Anse.

Tableau 1.10.1 Test du VIH/Sida (pour les femmes)

Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont été testées ou non, et selon le lieu du test pour celles qui ont été testées, et selon le désir d'être testées pour celles qui ne l'ont pas été et pourcentage de femmes qui n'ont pas été testées selon leur connaissance d'une source pour le test, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Femme a été testée dans le secteur :						Femme n'a pas été testée et désire être testée						Parmi les femmes non testées connaissance d'un endroit pour se faire tester				Effectif de femmes non testées
	Femme a été testée dans le secteur :			Femme n'a pas été testée et désire être testée			Femme n'a pas été testée et désire être testée			Femme n'a pas été testée et désire être testée			Parmi les femmes non testées connaissance d'un endroit pour se faire tester				
	Public	Privé	Autre	Ensemble <sup>1</sup>	Oui	Non	NSP <sup>2</sup>	Ensemble	Total	Effectif	Public	Privé	Autre	NSP <sup>2</sup>			
<b>Groupe d'âges</b>																	
15-19	0,6	0,4	0,6	1,5	45,0	40,4	13,1	98,5	100,0	1 211	9,0	7,4	3,1	81,8	1 192		
20-24	1,1	2,0	0,6	3,8	55,0	30,6	10,6	96,2	100,0	961	9,8	8,5	4,6	77,6	924		
25-29	1,0	2,8	0,6	4,6	52,9	33,2	9,3	95,4	100,0	770	11,8	12,4	4,9	73,9	735		
30-39	0,5	3,3	0,7	4,6	51,2	32,7	11,5	95,4	100,0	1 278	10,2	9,0	7,2	76,1	1 219		
40-49	0,5	2,4	0,8	3,8	45,2	38,0	13,0	96,2	100,0	942	5,5	9,4	3,6	81,8	906		
<b>État matrimonial</b>																	
Jamais en union	0,5	1,3	0,3	2,3	47,9	38,8	11,1	97,7	100,0	1 615	9,8	8,6	3,9	78,7	1 578		
Union avec cohabitation	0,7	2,3	0,7	3,8	49,4	35,0	11,9	96,2	100,0	2 537	9,2	7,8	5,3	79,7	2 441		
Union sans cohabitation	1,3	3,6	0,9	6,0	46,7	32,1	15,3	94,0	100,0	466	8,0	9,2	5,2	78,7	438		
Union rompue	0,9	2,3	1,3	4,8	58,3	27,9	9,0	95,2	100,0	544	8,5	16,6	4,1	71,9	518		
<b>Milieu de résidence</b>																	
Aire Métropolitaine	1,2	4,4	1,0	6,8	55,1	31,5	6,7	93,2	100,0	1 770	6,6	11,5	5,1	77,0	1 650		
Autre urbain	2,0	3,1	1,7	7,1	51,0	32,7	9,3	92,9	100,0	594	22,4	10,4	6,9	63,4	552		
Ensemble urbain	1,4	4,1	1,2	6,9	54,1	31,8	7,3	93,1	100,0	2 364	10,6	11,2	5,5	73,6	2 201		
Rural	0,1	0,5	0,2	0,9	45,8	38,0	15,3	99,1	100,0	2 798	8,1	7,5	4,1	82,3	2 774		
<b>Département</b>																	
Aire Métropolitaine	1,2	4,4	1,0	6,8	55,1	31,5	6,7	93,2	100,0	1 770	6,6	11,5	5,1	77,0	1 650		
Nord	1,0	1,3	1,3	3,6	43,7	38,5	14,2	96,4	100,0	438	12,3	5,7	3,8	78,8	422		
Nord-Est	0,5	0,8	0,5	2,3	61,2	27,9	8,6	97,7	100,0	173	17,5	1,3	16,9	65,5	169		
Nord-Ouest	0,3	0,9	0,0	1,2	44,5	36,6	17,7	98,8	100,0	183	16,7	8,7	4,0	74,9	181		
Artibonite	0,4	0,4	0,4	1,2	36,1	48,0	14,7	98,8	100,0	813	8,0	9,7	4,2	82,0	804		
Centre	0,1	0,8	0,3	1,3	51,5	34,7	12,5	98,7	100,0	350	5,1	13,5	7,1	77,4	345		
Ouest	0,3	1,8	0,4	2,5	49,4	30,2	17,9	97,5	100,0	613	10,3	10,2	1,7	80,2	598		
Sud	0,4	1,2	0,9	2,5	50,8	33,8	12,9	97,5	100,0	327	10,4	5,8	5,1	79,0	318		
Sud-Est	0,2	0,2	0,0	0,5	47,4	38,2	13,9	99,5	100,0	238	3,9	1,3	0,5	94,5	237		
Grande-Anse	0,8	0,7	0,1	2,1	58,6	29,2	10,1	97,9	100,0	256	20,7	5,8	5,5	68,9	251		
<b>Niveau d'instruction</b>																	
Aucun	0,1	0,1	0,0	0,3	39,8	41,2	18,7	99,7	100,0	1 273	6,8	4,3	2,0	89,0	1 269		
Alphabét/Primaire	0,4	1,2	0,4	2,2	51,9	35,8	10,1	97,8	100,0	2 444	8,3	6,4	5,1	81,5	2 389		
Secondaire ou plus	1,7	5,5	1,6	8,9	54,3	28,7	8,1	91,1	100,0	1 445	13,2	18,7	6,6	62,9	1 317		
Ensemble des femmes	0,7	2,1	0,7	3,6	49,6	35,2	11,6	96,4	100,0	5 161	9,2	9,1	4,7	78,5	4 975		

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés" concernant le lieu du test

<sup>2</sup> Comprend les femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida



Tableau 1.10.2 Test du VIH/Sida (pour les hommes)

Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont été testés ou non, et selon le lieu du test pour ceux qui ont été testés, et selon le désir d'être testés pour ceux qui ne l'ont pas été et pourcentage d'hommes qui n'ont pas été testés selon leur connaissance d'une source pour le test, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Homme a été testé dans le secteur :					Homme n'a pas été testé et désire être testé					Parmi les hommes non testés connaissance d'un endroit pour se faire tester					Effectif d'hommes non testés
	Homme a été testé dans le secteur :					Homme n'a pas été testé et désire être testé					Parmi les hommes non testés connaissance d'un endroit pour se faire tester					
	Public	Privé	Autre	Ensemble <sup>1</sup>	Oui	Non	NSP <sup>2</sup>	Ensemble	Total	Effectif	Public	Privé	Autre	NSP <sup>2</sup>		
<b>Groupe d'âges</b>																
15-19	0,1	0,2	0,1	0,7	56,2	33,1	10,0	99,3	100,0	768	18,4	5,3	3,9	73,9	763	
20-24	1,2	2,4	0,8	5,2	63,7	26,3	4,7	94,8	100,0	512	21,4	18,9	4,1	59,0	485	
25-29	3,4	6,7	0,2	10,4	56,7	29,6	3,3	89,6	100,0	448	20,5	12,7	10,8	57,5	402	
30-39	2,0	3,8	1,1	6,6	54,3	32,4	6,7	93,4	100,0	589	25,1	13,3	10,1	54,3	551	
40-49	1,4	3,1	3,5	8,1	56,4	27,6	7,9	91,9	100,0	282	15,7	17,6	4,6	62,3	259	
50-59	0,7	6,8	0,4	7,9	50,0	31,7	10,4	92,1	100,0	571	16,0	3,8	2,7	78,4	526	
<b>État matrimonial</b>																
Jamais en union	0,9	2,2	0,5	4,0	57,5	30,8	7,7	96,0	100,0	1 441	21,5	8,7	5,7	66,1	1 383	
Union avec cohabitation	1,6	4,6	1,2	7,6	53,1	31,6	7,6	92,4	100,0	1 430	18,2	12,1	6,0	65,3	1 321	
Union sans cohabitation	2,7	5,9	- 0,4	10,0	61,3	25,8	3,0	90,0	100,0	118	25,9	29,7	5,6	44,1	106	
Union rompue	1,8	2,2	0,2	4,2	63,8	24,9	7,0	95,8	100,0	182	13,8	6,0	6,1	74,9	175	
<b>Milieu de résidence</b>																
Aire Métropolitaine	2,4	9,1	1,3	12,8	47,5	36,4	3,4	87,2	100,0	811	24,8	16,0	4,0	57,7	707	
Autre urbain	1,9	3,0	1,8	7,1	58,8	27,9	6,2	92,9	100,0	356	30,9	11,6	10,1	50,8	330	
Ensemble urbain	2,2	7,2	1,5	11,0	50,9	33,8	4,2	89,0	100,0	1 166	26,7	14,6	5,9	55,5	1 038	
Rural	0,8	1,2	0,3	2,8	59,0	28,8	9,4	97,2	100,0	2 005	16,0	8,8	5,8	70,8	1 948	
<b>Département</b>																
Aire Métropolitaine	2,4	9,1	1,3	12,8	47,5	36,4	3,4	87,2	100,0	811	24,8	16,0	4,0	57,7	707	
Nord	0,6	3,0	0,8	4,5	59,3	30,1	6,2	95,5	100,0	280	25,0	3,7	8,5	64,4	268	
Nord-Est	0,5	0,0	0,5	1,0	66,6	26,4	6,0	99,0	100,0	100	15,5	5,1	6,9	77,6	99	
Nord-Ouest	1,2	0,3	1,0	2,9	49,8	33,4	13,8	97,1	100,0	136	10,3	8,7	2,5	82,5	132	
Artibonite	1,3	1,7	0,5	4,1	58,6	27,0	10,3	95,9	100,0	525	15,6	14,8	12,9	57,1	503	
Centre	0,2	0,3	0,8	1,2	48,6	32,5	17,7	98,8	100,0	245	14,7	17,2	3,1	66,9	242	
Ouest	1,2	2,1	0,3	5,0	62,2	29,6	3,2	95,0	100,0	466	17,7	8,4	3,1	73,1	442	
Sud	1,5	1,0	0,8	3,3	61,0	28,3	7,4	96,7	100,0	241	23,7	6,0	8,3	62,4	233	
Sud-Est	1,3	1,3	0,5	3,4	57,4	31,5	7,8	96,6	100,0	160	22,8	1,7	2,5	73,3	155	
Grande-Anse	0,4	1,0	0,1	1,6	65,9	20,2	12,3	98,4	100,0	207	17,3	6,0	2,0	76,8	204	
<b>Niveau d'instruction</b>																
Aucun	0,3	0,1	0,0	0,9	56,1	28,5	14,5	99,1	100,0	531	9,0	1,0	7,0	83,4	527	
Alphabét./Primaire	0,6	1,0	0,6	2,7	57,2	32,6	7,5	97,3	100,0	1 536	15,2	8,8	5,2	71,8	1 495	
Secondaire ou plus	2,9	8,3	1,4	12,7	54,4	28,9	4,0	87,3	100,0	1 104	32,6	19,2	6,2	45,8	964	
Ensemble des hommes	1,3	3,4	0,8	5,9	56,0	30,6	7,5	94,1	100,0	3 171	19,7	10,8	5,9	65,5	2 985	

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés" concernant le lieu du test

<sup>2</sup> Comprend les hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

Parmi les hommes non testés, les deux tiers (66 %) ne connaissaient pas un endroit où se faire tester. Ce manque d'information est plus marqué parmi les 15-19 ans et les 50-59 ans, les hommes en union rompue, en milieu rural, dans le département du Nord-Ouest et parmi les hommes sans instruction.

## 1.7 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

Les IST évoluent en synergie avec l'infection du VIH/Sida. L'EMMUS-III s'est intéressée à connaître le niveau de connaissance des IST par la population enquêtée, la prévalence déclarée et le comportement adopté en terme de conseil et de traitement en cas d'infection.

### *Connaissance des IST*

Un pourcentage très élevé de femmes (66 %) n'ont pas entendu parler d'IST (en dehors du VIH/Sida) (tableau 1.11.1). Cette ignorance est particulièrement importante parmi les jeunes de 15-19 ans (76 %), en milieu rural (75 %), dans les départements du Sud-Est (80 %), de l'Ouest (77 %), de l'Artibonite (75 %) et du Nord-Ouest (74 %) et parmi les femmes sans instruction (84 %).

Parmi les femmes qui ont entendu parler d'IST, 11 % ne connaissent aucun signe ou symptômes de ces infections chez les femmes et 12 % chez les hommes. En ce qui concerne les signes ou symptômes d'IST chez les femmes, les enquêtées de plus de 25 ans, celles en union avec cohabitation ou en union rompue, celles de l'Aire Métropolitaine, des départements du Nord, du Centre et du Sud, et celles de niveau secondaire sont mieux informées que les autres. Concernant les signes ou symptômes d'IST chez les hommes, les femmes les mieux informées sont celles de 30-39 ans, celles en union rompue, celles de l'Aire Métropolitaine, des départements du Nord et du Sud, et celles de niveau secondaire.

Par rapport aux femmes, une proportion relativement moins importante d'hommes n'ont pas entendu parler d'IST (51 % contre 66 %). Cette proportion reste néanmoins très élevée (tableau 1.11.2). Les hommes les moins bien informés de l'existence d'IST sont ceux de 15-19 ans (72 %), les célibataires (58 %), ceux du milieu rural (58 %), des départements du Nord-Ouest (74 %), et ceux sans instruction (64 %).

Parmi les hommes qui ont entendu parler d'IST, 13 % ne connaissent aucun signe ou symptômes de ces infections chez les femmes et 4 % chez les hommes. En ce qui concerne les signes ou symptômes d'IST chez les femmes, les enquêtés de plus de 20 ans, ceux en union sans cohabitation, ceux du Nord-Est, du Sud-est, du Centre et de la Grande-Anse, et ceux de niveau d'instruction primaire sont mieux informés que les autres. Concernant les signes ou symptômes d'IST chez les hommes, on observe beaucoup moins d'écarts que pour la connaissance des symptômes chez les femmes, mais les variations sont du même type.

Tableau 1.11.1 Connaissance des infections Sexuellement Transmissibles (IST) par les femmes

Pourcentage de femmes n'ayant pas entendu parler d'IST (en dehors du Sida) et répartition (en %) de celles qui en ont entendu parler selon leur connaissance des signes ou symptômes d'IST chez les femmes et chez les hommes, et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui n'a pas entendu parler d'IST	Effectif des femmes	Connaissance de signes ou symptômes d'IST chez les femmes				Connaissance de signes ou symptômes d'IST chez les hommes				Effectif de femmes ayant entendu parler d'IST
			Ne connaît aucun signe ou symp- tôme	Connaît un signe ou symp- tôme	Connaît 2+ signes ou symp- tômes	Total <sup>1</sup>	Ne connaît aucun signe ou symp- tôme	Connaît un signe ou symp- tôme	Connaît 2+ signes ou symp- tômes	Total <sup>1</sup>	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	75,5	1 211	18,2	37,0	44,8	100,0	19,5	35,9	44,6	100,0	297
20-24	61,7	961	14,0	45,8	40,2	100,0	17,3	41,4	41,3	100,0	368
25-29	59,2	770	8,7	36,0	55,3	100,0	10,9	36,9	52,2	100,0	315
30-39	62,1	1 278	6,5	40,4	53,0	100,0	6,8	42,0	51,1	100,0	484
40-49	69,6	942	12,2	36,9	51,0	100,0	12,5	41,6	45,9	100,0	286
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union	66,8	1 615	16,8	40,6	42,6	100,0	19,0	42,3	38,7	100,0	536
Union avec cohabitation	66,8	2 537	8,8	37,1	54,0	100,0	11,0	39,1	50,0	100,0	843
Union sans cohabitation	66,0	466	12,8	39,3	47,9	100,0	10,5	42,8	46,7	100,0	159
Union rompue	61,0	544	6,7	47,2	46,1	100,0	6,4	34,7	58,8	100,0	212
<b>Milieu de résidence</b>											
Aire Métropolitaine	56,1	1 770	7,0	46,4	46,6	100,0	8,0	47,8	44,3	100,0	777
Autres urbain	56,5	594	11,4	32,0	56,6	100,0	14,2	32,5	53,3	100,0	258
Ensemble urbain	56,2	2 364	8,1	42,8	49,1	100,0	9,5	43,9	46,5	100,0	1 035
Rural	74,5	2 798	16,2	34,9	48,9	100,0	17,6	33,9	48,4	100,0	714
<b>Département</b>											
Aire Métropolitaine	56,1	1 770	7,0	46,4	46,6	100,0	8,0	47,8	44,3	100,0	777
Nord	67,5	438	8,3	39,3	52,4	100,0	10,0	41,6	48,3	100,0	142
Nord-Est	55,9	173	15,8	23,4	60,8	100,0	19,6	32,0	48,3	100,0	76
Nord-Ouest	73,8	183	17,3	26,9	55,9	100,0	21,4	26,1	52,4	100,0	48
Artibonite	74,9	813	23,5	36,8	39,7	100,0	23,4	28,2	48,4	100,0	204
Centre	67,5	350	8,9	30,1	61,1	100,0	11,3	31,6	57,1	100,0	114
Ouest	77,2	613	19,4	24,3	56,2	100,0	22,7	26,0	51,2	100,0	140
Sud	67,2	327	8,6	51,1	40,2	100,0	10,5	47,6	41,9	100,0	107
Sud-Est	80,2	238	10,6	41,3	48,1	100,0	11,1	45,7	43,1	100,0	47
Grande-Anse	63,5	256	14,0	29,7	56,3	100,0	15,2	29,4	55,4	100,0	94
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	83,5	1 273	22,8	30,6	46,6	100,0	19,2	36,1	44,7	100,0	210
Alphabét./Primaire	71,1	2 444	11,6	37,3	51,2	100,0	14,5	36,8	48,7	100,0	706
Secondaire ou plus	42,3	1 445	8,4	43,8	47,8	100,0	9,8	43,4	46,8	100,0	834
Ensemble	66,1	5 161	11,4	39,6	49,0	100,0	12,8	39,9	47,3	100,0	1 749

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

Tableau 1.11.2 Connaissance des infections Sexuellement Transmissibles (IST) par les hommes

Pourcentage d'hommes n'ayant pas entendu parler d'IST (en dehors du Sida) et répartition (en %) de ceux qui en ont entendu parler selon leur connaissance des signes ou symptômes d'IST chez les femmes et chez les hommes et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui n'a pas entendu parler d'IST	Effectif d'hommes	Connaissance de signes ou symptômes chez les femmes				Connaissance de signes ou symptômes chez les hommes				Effectif de femmes ayant entendu parler d'IST
			Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes	Total <sup>1</sup>	Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes	Total <sup>1</sup>	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	72,3	768	23,0	43,7	33,3	100,0	5,4	50,6	44,0	100,0	213
20-24	42,3	512	10,8	36,3	52,9	100,0	4,9	41,0	54,1	100,0	296
25-29	32,1	448	11,7	46,2	42,1	100,0	5,3	41,9	52,8	100,0	304
30-39	39,4	589	9,9	37,7	52,3	100,0	2,5	44,6	52,9	100,0	357
40-49	46,4	282	10,5	34,6	54,9	100,0	3,0	46,4	50,6	100,0	151
50-59	56,2	571	13,6	39,5	46,9	100,0	2,1	47,2	50,7	100,0	250
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union	57,8	1 441	16,6	43,2	40,1	100,0	4,9	45,1	50,0	100,0	608
Union avec cohabitation	46,1	1 430	10,5	38,0	51,4	100,0	2,5	45,3	52,2	100,0	771
Union sans cohabitation	29,8	118	7,0	24,5	68,5	100,0	5,0	30,7	64,4	100,0	83
Union rompue	39,9	182	12,7	46,0	41,2	100,0	7,3	49,9	42,8	100,0	110
<b>Milieu de résidence</b>											
Aire Métropolitaine	36,8	811	13,3	32,9	53,7	100,0	5,1	42,0	52,8	100,0	513
Autres urbain	40,3	356	15,2	36,5	48,3	100,0	4,3	42,2	53,5	100,0	212
Ensemble urbain	37,8	1 166	13,9	34,0	52,2	100,0	4,9	42,1	53,0	100,0	725
Rural	57,8	2 005	12,0	45,0	43,0	100,0	3,0	47,1	49,9	100,0	846
<b>Département</b>											
Aire Métropolitaine	36,8	811	13,3	32,9	53,7	100,0	5,1	42,0	52,8	100,0	513
Nord	53,6	280	18,7	44,2	37,1	100,0	5,6	53,5	40,8	100,0	130
Nord-Est	49,9	100	5,7	38,7	55,6	100,0	2,3	36,7	61,0	100,0	50
Nord-Ouest	74,0	136	18,0	37,2	44,8	100,0	5,5	26,8	67,7	100,0	35
Artibonite	41,4	525	12,7	46,7	40,6	100,0	3,1	38,8	58,1	100,0	307
Centre	58,7	245	7,9	38,0	54,0	100,0	3,3	45,0	51,7	100,0	101
Ouest	60,5	466	15,1	33,8	51,1	100,0	2,1	46,2	51,8	100,0	184
Sud	62,6	241	14,7	53,6	31,7	100,0	6,1	60,3	33,6	100,0	90
Sud-Est	49,1	160	5,4	51,1	43,5	100,0	2,0	57,8	40,2	100,0	81
Grande-Anse	62,0	207	9,3	43,2	47,5	100,0	0,6	50,3	49,1	100,0	79
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	64,2	531	18,1	46,0	35,9	100,0	3,9	45,7	50,4	100,0	190
Alphabét./Primaire	58,9	1 536	9,5	45,3	45,2	100,0	2,8	48,4	48,8	100,0	630
Secondaire ou plus	32,0	1 104	14,3	33,9	51,8	100,0	4,8	41,5	53,7	100,0	750
Ensemble	50,5	3 171	12,9	39,9	47,3	100,0	3,9	44,8	51,3	100,0	1 571

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

## Prévalence déclarée d'IST

Une proportion relativement élevée de femmes (4 %) ont déclaré spontanément avoir eu une IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête (tableau 1.12). Il est fort probable que cette prévalence déclarée soit sous-estimée du fait que certaines femmes n'osent pas avouer ce type de maladies et du fait que certaines femmes ne connaissent pas les signes et symptômes d'IST. On constate néanmoins que les femmes âgées entre 20-24 ans (7 %) sont celles pour lesquelles la prévalence déclarée des IST est la plus élevée. Il en est de même de celles jamais en union (10 %), de celles du département du Nord-Est (9 %) et de celles d'instruction secondaire (8 %). Là encore, ces écarts doivent être interprétés avec prudence. Ils ne résultent peut-être pas de différences de prévalence réelle, mais simplement du fait que certaines femmes sont plus à l'aise que d'autres pour en parler et/ou que certaines femmes sont plus conscientes que d'autres de leur état.

Tableau 1.12 Prévalence déclarée des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Répartition (en %) des femmes et des hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels selon qu'ils ont déclaré avoir eu ou non une Infection Sexuellement Transmissible et/ou des symptômes associés aux Infections Sexuellement Transmissibles au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Femmes qui ont déclaré avoir eu :							Hommes qui ont déclaré avoir eu :				
	Des pertes vaginales					Ensemble des IST et des symptômes d'IST	Effectif	Écoulement du pénis			Ensemble des IST et symptômes d'IST	Effectif
	Une IST	Mal-odorantes	Autres signes	Mal-odorantes/autres signes	Ulcère génital			Une IST	Écoulement du pénis	Ulcère génital		
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	3,2	5,7	10,1	4,3	4,0	13,7	404	0,4	3,7	4,9	8,0	401
20-24	7,2	9,7	14,0	7,7	3,9	20,0	742	1,1	6,3	3,7	8,9	445
25-29	4,2	4,6	13,6	3,9	6,6	17,2	690	1,5	9,8	1,3	10,5	401
30-39	3,4	4,7	9,7	3,0	3,1	13,1	1 257	4,4	8,3	5,7	9,9	566
40-49	1,5	3,1	8,8	2,2	3,9	10,8	934	2,3	3,5	9,7	13,2	281
50-59	-	-	-	-	-	-	-	3,6	6,3	0,9	6,6	568
<b>État matrimonial</b>												
Jamais en union	10,3	9,7	13,3	8,5	4,4	20,2	482	0,8	5,3	2,9	7,7	931
Union avec cohabitation	3,2	4,4	11,0	2,9	4,1	14,1	2 536	2,3	6,2	3,7	9,2	1 430
Union sans cohabitation	2,9	5,5	7,4	3,4	3,5	11,7	466	2,3	7,1	3,4	7,1	118
Union rompue	1,2	5,8	11,9	5,4	4,6	14,3	544	11,6	15,7	12,3	17,8	182
<b>Milieu de résidence</b>												
Aire Métropolitaine	5,1	7,4	10,3	5,6	2,9	14,9	1 307	0,6	2,2	1,1	3,3	678
Autres urbain	4,4	3,9	10,9	3,0	4,5	15,1	446	2,7	6,2	3,3	8,3	306
Ensemble urbain	5,0	6,5	10,5	4,9	3,3	15,0	1 753	1,3	3,4	1,8	4,9	984
Rural	2,9	4,4	11,4	3,3	4,8	14,3	2 275	3,0	8,4	5,3	11,7	1 678
<b>Département</b>												
Aire Métropolitaine	5,1	7,4	10,3	5,6	2,9	14,9	1 307	0,6	2,2	1,1	3,3	678
Nord	4,7	6,9	13,9	3,8	4,2	19,8	333	3,1	6,7	4,1	10,0	237
Nord-Est	9,0	2,8	16,6	2,8	5,6	19,5	130	1,4	9,4	4,5	12,1	84
Nord-Ouest	1,2	3,1	8,9	1,2	3,2	12,6	148	0,6	7,8	5,7	9,6	110
Artibonite	4,5	4,7	11,9	3,9	4,1	14,0	681	9,9	17,9	10,6	23,7	441
Centre	1,8	3,8	7,0	3,7	4,8	8,2	292	1,1	1,9	0,2	2,1	210
Ouest	1,7	4,0	12,2	2,4	5,8	14,8	480	0,1	5,2	5,3	9,3	401
Sud	2,5	3,0	10,1	2,0	2,9	12,9	262	1,1	5,2	1,6	6,4	193
Sud-Est	1,2	4,8	7,3	4,4	5,6	10,6	189	1,0	2,5	0,6	2,9	132
Grande-Anse	1,4	3,8	13,0	3,1	7,3	18,6	205	0,2	6,2	3,8	8,4	175
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	2,5	5,5	11,1	3,4	4,3	14,3	1 217	4,9	9,2	2,3	11,0	479
Alphabét./Primaire	2,6	4,8	11,5	3,9	4,7	14,5	1 852	2,4	7,8	4,2	9,6	1 224
Secondaire ou plus	7,6	6,2	9,8	4,9	2,7	15,1	959	1,1	3,8	4,5	7,7	958
<b>Ensemble</b>	3,8	5,3	11,0	4,0	4,1	14,6	4 028	2,4	6,6	4,0	9,2	2 662

Par ailleurs, on a essayé de déterminer si les femmes avaient présenté des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois : 5 % ont déclaré avoir eu des pertes malodorantes, 11 % ont eu des pertes accompagnées de brûlures, de prurit, de fièvre, ou de douleurs abdominales basses ou lombaires non associées aux règles, 4 % ont eu des pertes malodorantes et associées aux autres symptômes et 4 % des femmes ont déclaré avoir eu une plaie ou un ulcère génital. La prévalence totale déclarée d'IST (selon les déclarations spontanées et selon les symptômes), estimée ici à 15 %, doit être prise comme un ordre de grandeur et non comme une estimation précise car la présence de ces différents symptômes ou signes ne sont pas toujours la preuve d'une IST. On constate néanmoins que les femmes de 20-24 ans (20 %), celles jamais en union (20 %) et celles du Nord (20 %), du Nord-Est (20 %) et de la Grande-Anse (19 %) seraient celles ayant eu le plus fréquemment des IST.

Une proportion plus faible d'hommes que de femmes (2 % contre 4 %) ont déclaré spontanément avoir eu une IST (tableau 1.12). Par ailleurs, 7 % d'hommes ont déclaré avoir eu un écoulement, 7 % une plaie ou ulcère génital. Globalement, d'après les déclarations spontanées et/ou les symptômes, 9 % des hommes auraient eu une IST au cours des 12 derniers mois. Si on se base sur cette mesure de la prévalence, les hommes de 40-49 ans (13 %), ceux en union rompue (18 %), ceux du milieu rural (12 %), ceux sans instruction (11 %) et surtout ceux de l'Artibonite (24 %) seraient les plus atteints d'IST.

### ***IST et comportement***

Parmi les femmes identifiées comme ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois, près des deux tiers (63 %) ont déclaré avoir recherché des conseils ou un traitement, 56 % en ont informé leur(s) partenaire(s), cependant 68 % n'avaient pris elles-mêmes aucune mesure pour éviter d'infecter leur(s) partenaire(s) (tableau 1.13.1). Parmi les mesures prises, 20 % des femmes ont eu recours aux médicaments, 16 % ont évité les rapports sexuels et 2 % ont utilisé le condom. Une minorité (8 %) estimait non nécessaire l'adoption de mesures, le partenaire étant déjà infecté.

Les femmes qui ont recherché le plus fréquemment un traitement sont celles de 25-29 ans, celles du milieu urbain et surtout les femmes les plus éduquées (83 %). Le profil de celles qui ont informé leur partenaire est légèrement différent puisqu'il s'agit surtout des femmes de 25-29 ans et de 40-49 ans, de celles vivant en union avec cohabitation, résidant en milieu urbain, et de celles sans instruction. Quant aux femmes qui n'ont pris aucune mesure pour éviter d'infecter leur(s) partenaire(s), elles sont, proportionnellement, plus nombreuses parmi les 15-19 ans, celles en rupture d'union, celles vivant dans l'Aire Métropolitaine, et celles de niveau d'instruction primaire.

La majorité des hommes identifiés comme ayant eu une IST au cours des douze mois précédant l'enquête ont cherché des conseils ou un traitement (81 %, contre 63 % des femmes) (tableau 1.13.2). Deux tiers (62 %) ont informé leur partenaire et un peu plus d'un tiers (37 %, contre 67 % des femmes) n'ont adopté aucune mesure pour éviter d'infecter le(s) partenaire(s). Les mesures prises sont essentiellement l'abstinence sexuelle (48 %) et la prise de médicaments (34 %). Une infime minorité a déclaré avoir utilisé le condom (1 %).

Une analyse détaillée des résultats selon les caractéristiques socio-démographiques est difficile du fait de la fragmentation de l'échantillon en très petits nombres. Néanmoins, il semblerait que, par rapport au milieu urbain, les hommes vivant en milieu rural aient plus fréquemment recherché des conseils (85 % contre 64 %), informé leur partenaire de leur état (68 % contre 37 %) et pris des mesures pour éviter d'infecter leur(s) partenaire(s) (69 % contre 36 %).



Tableau 1.13.1 Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et comportement : femmes

Parmi les femmes qui ont déclaré avoir eu une/des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles qui ont cherché des conseils ou un traitement la dernière fois qu'elles ont eu une IST, pourcentage de celles qui ont informé leur(s) partenaire(s) et pourcentage de celles ayant pris des mesures spécifiques pour éviter d'infecter leur partenaire selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui ont cherché conseils/ traitement	Pourcentage qui ont informé leur(s) partenaire(s)	Mesures prises pour éviter d'infecter le(s) partenaire(s)					Effectif avec IST
			A évité les rapports sexuels	A utilisé des condoms	A pris des médica- ments	Aucune mesure : partenaire dès à infecté	Aucune mesure	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	56,0	30,9	6,1	1,8	14,4	0,0	84,1	55
20-24	56,9	55,8	10,1	3,7	19,0	15,1	62,3	148
25-29	76,8	67,0	16,0	1,1	20,1	3,4	74,0	119
30-39	66,2	52,0	16,2	0,8	19,1	9,6	67,2	164
40-49	51,2	64,1	28,8	0,6	24,6	4,9	59,4	101
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union	54,6	30,8	9,3	3,6	16,5	16,3	63,1	97
Union avec cohabitation	67,5	68,3	19,6	0,8	21,9	8,1	63,9	358
Union sans cohabitation	59,0	42,7	11,7	5,2	18,5	2,9	77,0	54
En rupture d'union	51,4	41,1	9,6	0,5	15,1	0,7	83,5	78
<b>Milieu de résidence</b>								
Aire Métropolitaine	62,8	47,8	12,2	1,6	19,0	6,5	71,1	195
Autre urbain	76,6	64,3	19,1	5,9	29,6	3,3	62,5	67
Ensemble urbain	66,4	52,0	13,9	2,7	21,7	5,7	68,9	262
Rural	59,3	59,4	17,4	0,8	18,2	9,9	66,5	325
<b>Département</b>								
Aire Métropolitaine	62,8	47,8	12,2	1,6	19,0	6,5	71,1	195
Nord	81,3	66,1	13,7	0,6	23,6	8,5	65,5	66
Nord-Est	67,4	51,3	32,4	4,5	25,8	0,0	60,8	25
Nord-Ouest	(57,1)	(66,9)	(16,7)	(1,7)	(14,7)	(0,0)	(83,3)	19
Artibonite	52,5	71,5	18,1	0,0	18,0	21,7	56,5	96
Centre	(60,3)	(68,3)	(1,9)	(0,0)	(1,5)	(0,0)	(96,6)	24
Ouest	58,9	48,4	24,6	0,2	23,8	8,4	58,9	71
Sud	77,6	64,7	12,0	3,9	20,5	3,7	71,4	34
Sud-Est	(48,3)	(35,7)	(3,5)	(0,0)	(8,2)	(0,0)	(87,0)	20
Grande-Anse	54,4	50,3	23,7	8,7	29,6	2,3	61,7	38
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	45,3	64,9	18,7	0,0	19,0	20,1	55,0	175
Alphabét./Primaire	62,5	57,3	17,9	1,4	18,1	2,6	74,7	268
Secondaire ou plus	83,1	43,1	8,5	4,1	23,9	3,5	69,5	145
Ensemble des femmes	62,5	56,1	15,8	1,7	19,8	8,0	67,6	588

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

**Tableau 1.13.2 Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et comportement : hommes**

Parmi les hommes qui ont déclaré avoir eu une/des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont cherché des conseils ou un traitement la dernière fois qu'ils ont eu une IST, pourcentage de ceux qui ont informé leur(s) partenaire(s) et pourcentage de ceux ayant pris des mesures spécifiques pour éviter d'infecter leur partenaire selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui ont cherché conseils/traitement	Pourcentage qui ont informé leur(s) partenaire(s)	Mesures prises pour éviter d'infecter le(s) partenaire(s)					Effectif avec IST
			A évité les rapports sexuels	A utilisé des condoms	A pris des médicaments	Aucune mesure : partenaire déjà infectée	Aucune mesure	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	(68,3)	(16,3)	(27,8)	(2,4)	(6,1)	(0,0)	(65,4)	32
20-24	(63,5)	(30,8)	(35,5)	(3,7)	(27,9)	(1,3)	(57,1)	40
25-29	*	*	*	*	*	*	*	42
30-39	81,5	80,8	58,6	0,0	24,5	0,7	26,4	56
40-49	*	*	*	*	*	*	*	37
50-59	(82,4)	(77,3)	(65,7)	(0,0)	(17,3)	(0,0)	(30,0)	37
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union	69,6	25,5	23,5	3,5	18,4	0,7	65,1	71
Union avec cohabitation	83,0	83,7	55,7	0,7	45,9	1,1	24,0	132
Union sans cohabitation	*	*	*	*	*	*	*	8
En rupture d'union	*	*	*	*	*	*	*	32
<b>Milieu de résidence</b>								
Aire Métropolitaine	*	*	*	*	*	*	*	22
Autre urbain	67,3	42,0	29,1	4,1	14,8	4,8	58,6	25
Ensemble urbain	64,2	36,7	18,4	2,2	19,1	2,5	63,8	48
Rural	85,2	68,4	55,7	1,2	37,0	0,4	30,8	196
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	(85,5)	(70,5)	(61,8)	(0,0)	(19,3)	(1,4)	(29,8)	53
Alphabét./Primaire	81,6	63,5	59,1	0,2	32,5	0,0	36,0	118
Secondaire ou plus	77,3	54,2	21,9	4,3	45,3	1,6	44,7	74
Ensemble des hommes	81,1	62,2	48,4	1,4	33,5	0,8	37,3	244

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

\* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

## 1.8 NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS

Au cours de l'EMMUS-III, on a cherché à connaître le nombre de partenaires sexuels des enquêtés au cours des douze mois ayant précédé l'enquête. La multiplicité des partenaires sexuels est en relation directe avec la probabilité d'être infecté en cas de relations non protégées. Il est néanmoins bon de rappeler que les déclarations des enquêtés sur le nombre de partenaires peuvent ne pas toujours traduire fidèlement la réalité du fait que certains enquêtés ne déclarent pas leurs partenaires sexuels, considérant que cela fait partie de leur vie privée.

La quasi-totalité des femmes en union (96 %) ont déclaré n'avoir eu qu'un partenaire sexuel (y compris le conjoint) au cours des 12 derniers mois ; 4 % ont déclaré ne pas avoir eu de partenaire et une infime minorité (0,4 %) ont déclaré avoir eu deux partenaires ou plus (tableau 1.14.1). Le nombre moyen de partenaires sexuels, y compris le conjoint, rapporté par les femmes en union, est de 1,0 et ce nombre ne varie pas selon les différentes caractéristiques socio-démographiques.

Tableau 1.14.1 Nombre de partenaires sexuels : femmes

Répartition (en %) des femmes par nombre de personnes avec qui elles ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Femmes en union						Femmes en union						Femmes qui ne sont pas en union							
	Nombre de partenaires (y compris le conjoint)				Nombre moyen de par-tenaires	Nombre de partenaires (non compris le conjoint)				Nombre moyen de par-tenaires	Effectif de femmes en union	Nombre de partenaires				Nombre moyen de par-tenaires	Effectif de femmes qui ne sont pas en union			
	0		1			2+		Total <sup>1</sup>				0		1				2+		Total <sup>1</sup>
	0	1	2	3		4	5	6	7			8	9	10	11			12		
<b>Groupe d'âges</b>																				
15-19	3,9	95,7	0,4	100,0	1,0	54,3	45,3	0,4	100,0	0,5	376	84,2	15,6	0,3	100,0	0,2	1 966			
20-24	2,4	96,5	1,2	100,0	1,0	64,8	34,2	1,0	100,0	0,4	957	62,6	36,5	0,9	100,0	0,4	962			
25-29	3,6	95,9	0,5	100,0	1,0	83,1	16,7	0,2	100,0	0,2	1 156	65,3	33,7	1,0	100,0	0,4	459			
30-39	3,7	96,1	0,1	100,0	1,0	86,2	13,7	0,1	100,0	0,1	2 006	71,5	27,4	1,1	100,0	0,3	438			
40-49	5,1	94,7	0,3	100,0	1,0	88,3	11,7	0,0	100,0	0,1	1 462	89,8	9,5	0,7	100,0	0,1	377			
<b>Milieu de résidence</b>																				
Aire Métropolitaine	4,9	94,7	0,4	100,0	1,0	79,1	20,7	0,3	100,0	0,2	1 613	73,2	26,2	0,6	100,0	0,3	1 851			
Autre urbain	4,8	94,3	0,9	100,0	1,0	77,0	22,4	0,6	100,0	0,2	609	76,7	22,5	0,8	100,0	0,2	586			
Ensemble urbain	4,9	94,6	0,5	100,0	1,0	78,5	21,1	0,4	100,0	0,2	2 222	74,0	25,3	0,6	100,0	0,3	2 437			
Rural	3,2	96,4	0,4	100,0	1,0	82,0	17,8	0,2	100,0	0,2	3 736	79,5	19,9	0,6	100,0	0,2	1 764			
<b>Département</b>																				
Aire Métropolitaine	4,9	94,7	0,4	100,0	1,0	79,1	20,7	0,3	100,0	0,2	1 613	73,2	26,2	0,6	100,0	0,3	1 851			
Nord	3,8	95,6	0,6	100,0	1,0	79,9	19,8	0,2	100,0	0,2	532	77,3	21,7	1,0	100,0	0,3	320			
Nord-Est	2,9	96,9	0,1	100,0	1,0	83,8	16,0	0,1	100,0	0,2	200	83,6	16,1	0,2	100,0	0,2	156			
Nord-Ouest	7,7	92,0	0,3	100,0	0,9	84,3	15,6	0,1	100,0	0,2	227	80,3	19,3	0,2	100,0	0,2	153			
Artibonite	3,0	96,8	0,2	100,0	1,0	71,3	28,6	0,1	100,0	0,3	1 092	73,6	24,9	1,5	100,0	0,3	415			
Centre	3,1	96,8	0,1	100,0	1,0	89,5	10,3	0,1	100,0	0,1	508	78,7	20,9	0,4	100,0	0,2	196			
Ouest	3,6	96,0	0,4	100,0	1,0	87,9	11,7	0,4	100,0	0,1	727	81,2	18,4	0,4	100,0	0,2	468			
Sud	3,2	95,8	1,0	100,0	1,0	80,1	19,0	0,8	100,0	0,2	417	79,5	20,5	0,0	100,0	0,2	270			
Sud-Est	2,3	97,0	0,6	100,0	1,0	83,7	16,1	0,3	100,0	0,2	311	83,7	16,3	0,0	100,0	0,2	189			
Grande-Anse	3,3	96,0	0,7	100,0	1,0	84,8	14,8	0,4	100,0	0,2	330	76,1	23,0	0,9	100,0	0,2	182			
<b>Niveau d'instruction</b>																				
Aucun	3,2	96,5	0,3	100,0	1,0	84,7	15,2	0,1	100,0	0,2	2 025	77,8	21,2	0,9	100,0	0,2	470			
Alphabét./Primaire	3,9	95,8	0,4	100,0	1,0	81,4	18,3	0,3	100,0	0,2	2 818	80,9	18,7	0,4	100,0	0,2	1 988			
Secondaire ou plus	4,9	94,4	0,8	100,0	1,0	71,5	28,0	0,5	100,0	0,3	1 115	70,7	28,5	0,8	100,0	0,3	1 742			
<b>Ensemble des Femmes</b>																				
	3,8	95,8	0,4	100,0	1,0	80,7	19,1	0,3	100,0	0,2	5 958	76,4	23,0	0,6	100,0	0,2	4 201			

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

Tableau 1.14.2 Nombre de partenaires sexuels : hommes

Répartition (en %) des hommes par nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Hommes en union					Hommes en union					Hommes qui ne sont pas en union				
	Nombre de partenaires (y compris le conjoint)					Nombre de partenaires (non compris le conjoint)					Nombre de partenaires				
	Nombre moyen de par-tenaires					Total <sup>1</sup>					Effectif d'hommes qui ne sont pas en union				
	0	1	2+	Total <sup>1</sup>		0	1	2+	Total <sup>1</sup>		0	1	2+	Total <sup>1</sup>	
<b>Groupe d'âges</b>															
15-19	(0,0)	(81,3)	(18,7)	100,0	(1,5)	(10,7)	(70,7)	(18,7)	100,0	(1,4)	18	61,5	26,2	12,4	100,0
20-24	2,8	40,9	56,3	100,0	2,0	37,4	18,0	44,6	100,0	1,5	120	32,4	40,2	27,4	100,0
25-29	0,0	70,0	29,9	100,0	1,6	58,1	23,9	17,9	100,0	0,8	187	35,0	39,3	25,8	100,0
30-39	1,2	73,5	25,3	100,0	1,3	72,2	20,2	7,6	100,0	0,4	458	38,5	22,1	39,3	100,0
40-49	0,6	72,1	27,3	100,0	1,4	71,0	22,1	6,9	100,0	0,4	258	(34,7)	(17,8)	100,0	(1,2)
50-59	2,1	82,1	15,8	100,0	1,4	81,5	12,9	5,6	100,0	0,4	507	48,8	39,5	11,7	100,0
<b>Milieu de résidence</b>															
Aire Métropolitaine	0,0	71,1	28,9	100,0	1,4	67,3	18,1	14,5	100,0	0,6	308	43,0	31,0	25,9	100,0
Autre urbain	2,7	66,7	30,7	100,0	2,0	58,4	25,7	15,9	100,0	1,3	150	43,7	33,6	22,7	100,0
Ensemble urbain	0,9	69,6	29,5	100,0	1,6	64,4	20,6	15,0	100,0	0,8	458	43,2	31,8	25,0	100,0
Rural	1,6	74,7	23,7	100,0	1,3	72,2	18,3	9,4	100,0	0,5	1 090	50,7	32,5	16,8	100,0
<b>Département</b>															
Aire Métropolitaine	0,0	71,1	28,9	100,0	1,4	67,3	18,1	14,5	100,0	0,6	308	43,0	31,0	25,9	100,0
Nord	2,4	75,6	22,1	100,0	1,8	72,2	19,8	7,9	100,0	0,9	133	45,6	36,0	18,4	100,0
Nord-Est	0,8	75,3	23,4	100,0	1,3	67,3	22,7	9,4	100,0	0,4	45	39,7	39,1	21,2	100,0
Nord-Ouest	0,0	83,1	16,9	100,0	1,4	73,3	20,2	6,5	100,0	0,6	63	53,0	32,3	14,8	100,0
Artibonite	1,2	73,2	25,7	100,0	1,4	69,7	17,3	13,0	100,0	0,5	300	55,8	20,5	23,7	100,0
Centre	0,8	82,4	16,9	100,0	1,3	76,6	19,5	3,9	100,0	0,4	158	49,7	32,2	18,1	100,0
Ouest	3,2	67,5	29,3	100,0	1,4	68,0	17,1	14,9	100,0	0,5	249	44,2	36,9	18,9	100,0
Sud	0,6	70,8	28,5	100,0	1,5	66,5	24,3	9,2	100,0	0,6	110	49,4	37,5	13,1	100,0
Sud-Est	1,5	73,1	25,5	100,0	1,5	70,0	24,2	5,8	100,0	0,6	84	56,9	26,5	16,5	100,0
Grande-Anse	3,2	72,3	24,5	100,0	1,5	72,4	16,9	10,7	100,0	0,6	96	48,8	40,8	10,3	100,0
<b>Niveau d'instruction</b>															
Aucun	0,9	84,6	14,5	100,0	1,2	81,0	15,2	3,9	100,0	0,3	369	60,0	32,1	7,9	100,0
Alphabét./Primaire	1,3	72,3	26,4	100,0	1,4	70,2	20,4	9,4	100,0	0,6	753	52,1	30,6	17,4	100,0
Secondaire ou plus	1,9	65,1	33,1	100,0	1,6	59,9	19,9	20,3	100,0	0,8	426	39,0	34,1	26,9	100,0
Ensemble des hommes	1,4	73,2	25,4	100,0	1,4	69,9	19,0	11,1	100,0	0,6	1 548	47,4	32,2	20,4	100,0
															0,9 1 623

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Si l'on exclut le conjoint, 81 % des femmes en union n'auraient eu aucun partenaire au cours des 12 derniers mois, 19 % en auraient eu un ou plus. Le nombre moyen de partenaire est ici de 0,2. Il semble que ce sont surtout les femmes en union les plus jeunes qui ont des partenaires sexuels en dehors de leur conjoint (nombre moyen de 0,5 chez les 15-19 ans et 0,4 chez les 20-24 ans).

Chez les femmes non en union, la majorité (76 %) ont déclaré n'avoir eu aucun partenaire et 23 % en avoir eu un seul. Le nombre moyen de partenaire parmi cette catégorie de femmes est de 0,2 et il ne présente que très peu de variations selon les différents caractéristiques.

Parmi les hommes en union, 73 % ont déclaré n'avoir eu qu'une seule partenaire (y compris l'épouse) et 25 % ont déclaré deux partenaires ou plus (tableau 1.14.2). Le nombre moyen de personnes (y compris le conjoint) avec qui les hommes en union ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois est de 1,4. Si on exclut l'épouse, 19 % des hommes ont déclaré avoir eu une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et 11 % deux partenaires. Le nombre moyen de partenaires est de 0,6. Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques, ce sont les hommes de moins de 25 ans, ceux des villes autres que la capitale, ceux du Nord et ceux d'instruction secondaire qui ont les nombres moyens de partenaires (épouse non comprise) les plus élevés.

Parmi les hommes non en union, 32 % ont déclaré avoir eu une partenaire et 20 % deux partenaires ou plus. Le nombre moyen de partenaires est de 0,9 et il dépasse 1,0 chez les hommes de 20-49 ans, ceux du milieu urbain, du Nord, du Nord-Est et chez les hommes de niveau d'instruction secondaire ou plus.

## **1.9 CONNAISSANCE ET UTILISATION DU CONDOM**

Les résultats relatifs à la connaissance et à l'utilisation du condom portent sur les enquêtés qui connaissent l'existence du VIH/Sida et qui étaient sexuellement actifs au moment de l'enquête. La question de l'utilisation du condom est vitale puisque c'est le seul moyen disponible pour se protéger contre les IST et le VIH/Sida lorsqu'on a des rapports sexuels avec un partenaire dont le statut sérologique est inconnu. Trois aspects sont abordés dans cette section : la connaissance, l'accès et l'utilisation du condom.

L'analyse du tableau 1.15 1 révèle que 96 % des femmes connaissent le condom. Peu de variations apparaissent selon les caractéristiques socio-démographiques, à l'exception des départements (le niveau de connaissance passe d'un minimum de 88 % dans l'Artibonite à 98 % dans le Nord-Est) et du niveau d'instruction.

Parmi les femmes connaissant le condom, 21 % connaissent une source d'approvisionnement dans le secteur médical public, 10 % dans le secteur médical privé, 9 % dans le secteur médical mixte et 50 % en dehors du secteur médical. Par ailleurs, un peu plus des deux tiers des femmes (69 %) ont déclaré pouvoir se procurer un condom en cas de besoin. Globalement, les femmes qui ne connaissent pas une source d'approvisionnement et celles qui ne pourraient pas se procurer un condom elles-mêmes en cas de besoin sont considérées comme ayant des problèmes d'accès au condom. Un tiers des femmes connaissant le condom sont dans cette situation (36 %) : il s'agit plus particulièrement des femmes de 40-49 ans, de celles en union avec cohabitation, des femmes du milieu rural, du Centre, du Nord-Ouest, du Sud-Est et des femmes sans instruction.

Tableau 1.15.1 Connaissance et utilisation du condom par les femmes

Pourcentage de femmes qui connaissent le VIH/Sida, qui ont déjà eu des rapports sexuels et qui connaissent le condom, et parmi ces femmes, pourcentage de celles qui connaissent un endroit où se procurer des condoms, pourcentage de celles qui peuvent se procurer un condom si elles le souhaitent, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels et pourcentage de celles qui utilisent le condom comme méthode de contraception mais qui n'en ont pas utilisé un au cours des derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui connaissent le condom	Effectif <sup>1</sup>	Pourcentage qui connaissent une source où se procurer un condom				Pourcentage qui ne connaissent pas une source et ne se procurer un condom si elles le souhaitent	Pourcentage qui ont utilisé le condom au cours des derniers rapports			Effectif <sup>2</sup>
			Pourcentage qui connaissent pas une source et ne se procurer un condom si elles le souhaitent					Plus tôt	l'enquête	rapports sexuels	
			Publique	Privée	Mixte	Autre					
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	97,5	397	14,2	7,1	5,5	59,5	66,3	36,3	5,4	9,5	387
20-24	97,7	724	19,6	14,2	7,8	55,1	75,4	27,0	5,7	4,1	707
25-29	96,8	677	26,6	14,4	8,5	54,5	77,3	26,0	2,7	2,4	656
30-39	96,3	1 219	23,8	8,7	9,4	50,4	68,9	34,9	1,2	0,4	1 175
40-49	93,5	912	16,0	6,3	9,8	38,8	56,7	50,3	0,8	0,5	852
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union	97,6	477	18,1	11,4	5,1	60,8	80,0	22,5	7,7	11,0	466
Union avec cohabitation	95,3	2 466	21,3	9,1	8,7	47,2	66,0	38,9	1,6	0,6	2 351
Union sans cohabitation	97,1	456	19,3	16,5	8,3	52,9	72,6	30,4	5,6	2,2	443
Union rompue	97,5	530	22,1	7,3	11,6	52,5	66,5	36,0	0,3	2,9	517
<b>Milieu de résidence</b>											
Aire Métropolitaine	100,0	1 299	21,0	7,9	4,5	65,7	82,3	17,7	3,7	3,3	1 299
Autre urbain	97,5	437	31,3	6,9	13,0	57,4	78,2	24,3	3,0	5,4	426
Ensemble urbain	99,4	1 735	23,5	7,6	6,6	63,6	81,3	19,3	3,5	3,8	1 724
Rural	93,5	2 194	18,4	12,0	10,3	39,1	57,8	49,1	1,9	1,2	2 052
<b>Département</b>											
Aire Métropolitaine	100,0	1 299	21,0	7,9	4,5	65,7	82,3	17,7	3,7	3,3	1 299
Nord	95,4	324	28,2	3,4	6,1	40,4	60,9	43,9	1,4	2,6	310
Nord-Est	97,6	129	32,0	1,7	27,2	52,4	79,3	23,2	1,4	0,2	126
Nord-Ouest	92,9	141	26,7	11,2	8,5	35,8	52,5	55,1	0,9	0,9	131
Artibonite	87,6	635	20,1	22,4	12,5	35,6	63,1	51,0	2,2	1,9	557
Centre	92,2	283	13,9	15,2	13,4	29,8	47,2	61,3	3,6	3,7	260
Ouest	99,3	474	16,3	11,6	4,9	53,5	63,5	37,2	1,6	0,5	471
Sud	96,4	256	19,3	4,4	9,1	44,7	62,9	40,8	3,0	2,3	247
Sud-Est	95,9	183	12,4	0,9	2,2	38,1	48,4	55,9	0,5	1,3	175
Grande-Anse	98,2	205	26,7	8,6	24,4	51,5	74,1	27,7	3,4	3,9	201
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	91,0	1 146	16,3	7,4	7,8	38,9	53,1	56,8	1,1	0,3	1 042
Alphabét./Primaire	97,4	1 832	21,4	10,1	10,0	48,3	67,0	35,7	1,7	1,1	1 785
Secondaire ou plus	99,8	951	24,4	12,6	7,0	66,5	88,5	11,8	6,2	7,1	949
Ensemble	96,1	3 929	20,7	10,0	8,6	50,3	68,6	35,5	2,6	2,4	3 777

<sup>1</sup> Effectif de femmes connaissant le VIH et qui ont déjà eu des rapports sexuels

<sup>2</sup> Effectif de femmes qui connaissent le VIH/Sida, ont déjà eu des rapports sexuels et connaissent le condom

Tableau 1.15.2 Connaissance et utilisation du condom par les hommes

Pourcentage d'hommes qui connaissent le VIH/Sida, qui ont déjà eu des rapports sexuels et qui connaissent le condom, et parmi ces hommes, pourcentage de ceux qui connaissent un endroit où se procurer des condoms, pourcentage de ceux qui peuvent se procurer un condom s'ils le souhaitent, et pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage qui connaissent le condom	Effectif <sup>1</sup>	Pourcentage qui connaissent une source où se procurer un condom				Pourcentage qui ne connaissent pas une source et ne pourraient pas se procurer un condom s'ils souhaitaient	Pourcentage qui ont utilisé le condom au cours des derniers rapports		Effectif <sup>2</sup>
			Publique	Privée	Mixte	Autre		Au cours du dernier mois avant l'enquête	Plus tôt	
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	99,1	398	8,9	3,9	8,9	81,1	88,8	11,2	13,4	394
20-24	99,4	444	15,0	4,4	9,2	85,9	92,5	7,5	11,0	441
25-29	99,4	397	11,1	9,2	11,7	71,4	88,3	11,7	12,5	395
30-39	98,5	563	17,1	6,3	19,8	55,2	83,1	16,9	12,7	555
40-49	98,6	280	17,3	8,2	13,9	46,8	77,9	22,1	4,2	276
50-59	96,5	553	10,6	6,7	11,8	51,0	62,2	37,8	6,2	533
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union	99,5	923	9,9	3,7	10,7	80,6	90,1	9,9	13,2	918
Union avec cohabitation	97,8	1 413	15,0	8,6	13,6	54,6	75,5	24,5	8,6	1 382
Union sans cohabitation	98,9	118	26,9	3,8	9,6	80,5	88,8	11,2	11,3	117
Union rompue	98,5	181	8,3	4,5	20,0	56,1	79,2	20,8	6,7	178
<b>Milieu de résidence</b>										
Aire Métropolitaine	99,8	675	7,7	2,9	7,2	88,2	98,1	1,9	14,8	673
Autre urbain	99,4	305	19,6	4,1	19,1	69,1	89,0	11,0	14,0	303
Ensemble urbain	99,7	980	11,4	3,3	10,9	82,3	95,3	4,7	14,6	977
Rural	97,8	1 655	14,4	8,2	14,0	54,7	73,2	26,8	7,6	1 618
<b>Département</b>										
Aire Métropolitaine	99,8	675	7,7	2,9	7,2	88,2	98,1	1,9	14,8	673
Nord	98,4	237	16,8	2,5	12,2	49,8	67,9	32,1	6,7	233
Nord-Est	97,1	83	13,8	1,1	34,2	46,9	69,0	31,0	5,8	81
Nord-Ouest	98,8	105	13,3	6,9	21,0	37,7	58,8	41,2	6,1	104
Artibonite	97,8	441	22,3	17,8	12,9	55,6	85,4	14,6	10,7	432
Centre	96,3	200	4,7	13,3	17,5	51,5	75,0	25,0	10,4	192
Ouest	98,0	401	13,9	4,3	12,4	67,0	78,2	21,8	7,5	393
Sud	98,9	190	13,3	1,9	8,2	56,9	71,5	28,5	9,5	188
Sud-Est	97,4	130	9,1	0,2	3,0	72,9	75,2	24,8	7,3	127
Grande-Anse	99,6	173	18,3	4,8	28,8	57,9	75,2	24,8	9,4	172
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	96,3	463	6,7	7,4	9,2	48,1	57,7	42,3	5,6	446
Alphabét./Primaire	98,2	1 217	12,5	7,8	14,6	60,8	78,4	21,6	7,6	1 194
Secondaire ou plus	99,9	955	17,3	4,0	12,3	78,3	96,6	3,4	15,7	954
Ensemble	98,5	2 635	13,3	6,3	12,8	65,1	81,5	18,5	10,2	2 595

<sup>1</sup> Effectif d'hommes connaissant le VIH/Sida et ont déjà eu des rapports sexuels

<sup>2</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le VIH/Sida, ont déjà eu des rapports sexuels et qui connaissent le condom



Une faible proportion d'enquêtées (5 %) ont déclaré avoir utilisé le condom au cours de leurs derniers rapports sexuels. Les femmes qui ont le plus souvent déclaré avoir utilisé le condom lors de leurs dernières relations sexuelles sont celles de 15-19 ans, les célibataires, celles du milieu urbain et celles de niveau d'instruction secondaire ou plus.

Quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, la quasi-totalité des hommes interrogés (99 %) connaissent le condom (tableau 1.15.2). Parmi ceux-la, 13 % connaissent une source d'approvisionnement dans le secteur médical public, 6 % dans le secteur médical privé, 13 % dans le secteur médical mixte et 65 % en dehors du secteur médical. Par ailleurs, 82 % des hommes ont déclaré pouvoir se procurer un condom en cas de besoin. Globalement, les hommes qui ne connaissent pas une source d'approvisionnement et ceux qui ne pourraient pas se procurer un condom en cas de besoin sont considérés comme ayant des problèmes d'accès au condom. Moins d'un homme connaissant le condom sur cinq (19 %) est dans cette situation : il s'agit plus particulièrement de ceux de 50-59 ans, de ceux en union avec cohabitation, des hommes du milieu rural, du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Nord et des hommes sans instruction.

Les hommes déclarant avoir utilisé le condom au cours des derniers rapports sexuels sont relativement peu nombreux (16 %). On peut noter cependant des pourcentages relativement plus élevés parmi les jeunes de 15-19 ans (26 %), les célibataires (26 %), ceux de la capitale (26 %), et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (29 %).

L'utilisation du condom au cours des derniers rapports par les femmes qui connaissent le VIH/Sida varie fortement selon le type de partenaires (tableau 1.16.1). En général, quel que soit le partenaire, 6 % des femmes ont utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports : seulement 2 % l'ont fait lorsque les derniers rapports ont eu lieu avec le conjoint alors que 14 % des femmes ont utilisé un condom lorsque le dernier rapport a eu lieu avec quelqu'un d'autre que le conjoint. Les jeunes femmes utilisent le condom nettement plus que les autres, particulièrement s'il s'agit d'un partenaire autre que le conjoint : 17 % pour les 20-24 ans et 25 % pour les 15-19 ans. Quand les rapports ont eu lieu avec un autre partenaire, le pourcentage d'utilisation est également plus important par les femmes célibataires (27 %), par celles vivant dans l'Aire Métropolitaine (21 %), celles des départements du Centre (38 %) et de la Grande-Anse (22%). Par ailleurs, le niveau d'utilisation est significativement plus élevé chez les femmes de niveau secondaire comparé à celles de niveau d'instruction inférieur.

Comme chez les femmes, l'utilisation du condom au cours des derniers rapports par les hommes qui connaissent le VIH/Sida varie fortement selon le type de partenaires (tableau 1.16.2). Globalement, quel que soit le partenaire, 14 % des hommes ont utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports : seulement 4 % l'ont fait lorsque les derniers rapports ont eu lieu avec leur conjoint alors que 26 % ont utilisé un condom lorsque le dernier rapport a eu lieu avec quelqu'un d'autre que le conjoint. Les jeunes hommes utilisent le condom nettement plus fréquemment que les autres, particulièrement s'il s'agit d'une partenaire autre que l'épouse : 33 % pour les 15-19 ans, 27 % pour les 20-24 ans et 30 % pour les 25-29 ans. Quand les rapports ont eu lieu avec une autre partenaire, le pourcentage d'utilisation est également plus important par les hommes célibataires (32 %), par ceux vivant dans l'Aire Métropolitaine (45 %), ceux du Centre (29 %) et ceux de niveau secondaire ou plus (44 %).

Tableau 1.16.1 Utilisation du condom par les femmes et type de partenaire

Parmi les femmes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports avec leur conjoint, pourcentage de celles qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec quelqu'un d'autre et pourcentage de celles qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports quel que soit le partenaire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Conjoint		Autre partenaire		N'importe quel type de partenaire	
	Pourcentage	Effectif <sup>1</sup>	Pourcentage	Effectif <sup>2</sup>	Pourcentage	Effectif <sup>3</sup>
<b>Groupes d'âges</b>						
15-19	2,7	99	24,6	229	18,0	328
20-24	3,1	319	17,1	348	10,4	665
25-29	2,6	449	13,1	163	5,5	609
30-39	1,5	914	3,0	200	1,7	1 111
40-49	1,0	637	6,7	101	1,7	735
<b>État matrimonial</b>						
Jamais en union	NA	NA	26,7	326	26,8	326
Union avec cohabitation	1,7	2 319	10,0	143	2,2	2 454
Union sans cohabitation *		16	7,7	432	7,7	447
En rupture d'union	1,7	81	11,1	140	7,7	219
<b>Milieu de résidence</b>						
Aire Métropolitaine	2,2	650	20,8	373	9,0	1 019
Autre urbain	4,7	234	19,1	136	10,1	368
Ensemble urbain	2,9	885	20,3	509	9,3	1 388
Rural	1,2	1 532	8,8	532	3,1	2 059
<b>Département</b>						
Aire Métropolitaine	2,2	650	20,8	373	9,0	1 019
Nord	1,7	212	10,2	85	4,1	296
Nord-Est	0,9	90	9,7	25	2,8	114
Nord-Ouest	0,5	86	6,1	32	2,0	117
Artibonite	2,4	388	6,3	228	3,8	614
Centre	0,4	233	38,3	47	6,7	280
Ouest	1,9	330	3,7	91	2,3	421
Sud	2,8	163	13,9	68	6,1	230
Sud-Est	0,0	132	8,1	41	1,7	171
Grande-Anse	2,6	134	22,0	51	8,0	184
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun	0,6	862	3,6	239	1,3	1 097
Alphabét./Primaire	1,8	1 192	7,6	393	3,2	1 583
Secondaire ou plus	4,8	363	27,3	408	16,8	767
Effectif des femmes <sup>4</sup>	1,8	2 417	14,4	1 041	5,6	3 447

NA = Non applicable

\* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

<sup>1</sup> Effectif de femmes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec leur conjoint.

<sup>2</sup> Effectif de femmes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec quelqu'un d'autre.

<sup>3</sup> Effectif de femmes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec n'importe quel type de partenaire.

<sup>4</sup> Y compris les "non-déterminés"

Tableau 1.16.2 Utilisation du condom par les hommes et type de partenaire

Parmi les hommes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports avec leur conjoint, pourcentage de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec quelqu'un d'autre et pourcentage de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports quel que soit le partenaire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Conjoint		Autre partenaire		N'importe quel type de partenaire	
	Pourcentage	Effectif <sup>1</sup>	Pourcentage	Effectif <sup>2</sup>	Pourcentage	Effectif <sup>3</sup>
<b>Groupes d'âges</b>						
15-19	*	3	32,9	304	32,6	307
20-24	10,8	62	27,4	338	23,8	383
25-29	5,6	143	30,3	247	20,8	354
30-39	5,8	421	21,5	204	9,5	531
40-49	1,2	254	13,1	89	2,3	276
50-59	1,2	462	8,8	125	2,0	521
<b>État matrimonial</b>						
Jamais en union	NA	NA	31,8	716	31,7	718
Union avec cohabitation	3,3	1 323	21,3	347	5,0	1 395
Union sans cohabitation	*	5	13,5	113	14,3	115
En rupture d'union	*	13	13,0	131	12,5	144
<b>Milieu de résidence</b>						
Aire Métropolitaine	2,6	265	45,3	386	27,7	591
Autre urbain	7,7	116	33,6	177	22,4	263
Ensemble urbain	4,2	382	41,7	563	26,1	854
Rural	3,3	963	13,3	745	7,2	1 518
<b>Département</b>						
Aire Métropolitaine	2,6	265	45,3	386	27,7	591
Nord	2,4	118	19,6	116	10,9	211
Nord-Est	0,8	39	17,1	46	9,0	78
Nord-Ouest	1,6	52	14,0	49	7,8	94
Artibonite	6,2	257	7,4	190	6,8	400
Centre	1,0	134	29,4	78	11,7	191
Ouest	4,0	212	18,0	200	8,5	364
Sud	3,4	99	22,1	103	11,6	175
Sud-Est	4,8	81	17,8	56	10,0	118
Grande-Anse	4,4	87	18,9	83	12,1	150
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun	1,2	330	3,3	131	1,9	420
Alphabét./Primaire	2,1	682	12,9	595	6,7	1 122
Secondaire ou plus	8,9	332	43,5	581	29,9	829
Effectif des hommes <sup>4</sup>	3,5	1 344	25,5	1 308	14,0	2 372

NA = Non applicable

\* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

<sup>1</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec leur conjoint.

<sup>2</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec quelqu'un d'autre.

<sup>3</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le VIH/Sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec n'importe quel type de partenaire.

<sup>4</sup> Y compris les "non-déterminés"